

Research Paper

The Effect of Rose Aromatherapy on Anxiety Before Abdominal Operation



Samane Najafi¹ , Moosa Sajjadi², Amirreza Nasirzadeh³, *Hossein Jедди³

1. Department of Medical-Surgical Nursing , School of Nursing, Social Development & Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

2. Department of Medical-Surgical Nursing, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

3. Student Research Committee, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.



Citation Najafi S, Sajjadi M, Nasirzadeh A, Jедди H. [The Effect of Rose Aromatherapy on Anxiety Before Abdominal Operation (Persian)]. Quarterly of "The Horizon of Medical Sciences". 2020; 26(2):128-141. <https://doi.org/10.32598/hms.26.2.3043.4>

doi <https://doi.org/10.32598/hms.26.2.3043.4>



ABSTRACT

Received: 16 May 2019

Accepted: 07 Mar 2020

Available Online: 01 Apr 2020

Key words:

Rose, Aromatherapy,
Anxiety, Operation

Aims: Preoperative anxiety could increase postoperative pain, the need for analgesics, and the patient's hospital stay. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of aromatherapy with rose on preoperative anxiety before abdominal operation.

Methods & Materials This clinical trial was performed on 90 patients undergoing abdominal operation at 15Khordad Hospital, in 2017. The study patients were assigned to the intervention and control groups by permuted block randomization method (n=45/group). The study instrument was the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI). The STAI was completed before and after conducting the intervention in both study groups. The obtained data were analyzed by SPSS using descriptive statistics, Student's t-test, Paired Samples t-test, and Chi-squared test at a significance level of P<0.05.

Findings The mean±SD age of the investigated patients in the intervention and control groups were 37.13±31.35 and 44.15±51.65 years, respectively. Most frequent operation type was inguinal hernia in both study groups. Before the intervention, there was no significant difference between the two groups in terms of anxiety (P>0.05); however, after the intervention, there was a significant difference between the study groups in terms of apparent and total anxiety (P<0.05). Furthermore, there was no significant difference between the study groups, in terms of latent anxiety (P>0.05).

Conclusion Aromatherapy with rose is effective in decreasing the apparent anxiety of patients before surgery. Thus, it is recommended to be used as a complementary, inexpensive, and non-invasive treatment at healthcare centers.

Extended Abstract

1. Introduction

Preoperative anxiety is a part of the surgical experience and a pervasive problem [1] that affects patients' health [2]. Anxiety could delay the patient's recovery due to reduced ability to fight infections, delayed wound healing,

and the exacerbation of stress [3]. Furthermore, the effective dose of analgesics and anesthetics increase with anxiety [4].

Previous studies have indicated that red rose essential oil has an antidepressant effect; therefore, it could be effective in treating postpartum depression and the symptoms of Premenstrual Syndrome (PMS). Additionally, applying rose essential oil has been effective in reducing the severity of anxiety in mothers and infants without any adverse effects

* Corresponding Author:

Hossein Jедди

Address: Student Research Committee, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

Tel: +98 (51) 57225027

E-mail: one_hossein@yahoo.com

[5, 6]. Mohebi-Tabar et al. also supported that this plant has anti-anxiety effects and relieves biopsychological pain [7]. Red rose essential oil has a significant impact on reducing anxiety in nulliparous women during the active phase of labor [8]. In Iranian traditional medicine, using red rose has been recommended to improve migraine pain [9], dysmenorrhea [10], musculoskeletal pain, morning sickness in pregnant women, depression, and PMS [11].

The present study aimed to investigate the effect of aromatherapy with red rose essential oil on the severity of anxiety before abdominal surgery.

2. Materials and Methods

This clinical trial was conducted on patients undergoing abdominal surgery who were hospitalized in 15-Khordad Hospital in Bidokht of Gonabad City, Iran, in 2017. In total, 90 patients undergoing inpatient abdominal surgery

were selected by random sampling method. EmsiG oral thermometer, CF02 model; sphygmomanometer; ALPK2 stethoscope; Spielberger inventory, and red rose essential oil were implemented in the present research.

3. Results

The Mean \pm SD age of the investigated patients in the intervention and placebo groups was 37.13 \pm 31.35 and 44.15 \pm 51.65 years, respectively. The most frequent type of operation in both groups was inguinal hernia surgery. Prior to the intervention, there were no statistically significant differences between the study groups in terms of the severity of anxiety ($P>0.05$); however, after the intervention, the statistical difference was significant in terms of the severity of apparent and total anxiety scores ($P<0.05$), the same value was not significant in terms of the severity of latent anxiety ($P>0.05$) (Tables 1 & 2).

Table 1. Comparing latent and apparent anxiety between the study groups before and after the intervention

Anxiety	Study Phase	Group	Mean \pm SD	Between-groups		Intergroup	
				Statistical Test	P	Red Rose Aromatherapy Group	Placebo Group
Apparent	Before intervention	Red rose	51.05 \pm 44.7	Independent Samples t-test	0.079	Paired Samples t-test	Paired Samples t-test
		Placebo	64.56 \pm 47.7				
	After intervention	Red rose	64.94 \pm 42.7	Independent Samples t-test	0.005	0.005	<0.001
		Placebo	98.43 \pm 46.7				
latent	Before intervention	Red rose	24.28 \pm 45.8	Independent Samples t	0.175	Paired Samples t-test	Paired Samples t-test
		Placebo	64.67 \pm 48.9				
	After intervention	Red rose	24.32 \pm 44.8	Independent Samples t-test	0.068	<0.001	0.08
		Placebo	47.55 \pm 48.9				

Quarterly of
The Horizon of Medical Sciences

Table 2. Comparing the vital signs of patients in the study groups before and after the intervention

Group	Red Rose Aromatherapy				Placebo	
	Mean \pm SD				Before Intervention	After Intervention
Study Phase	Pre-test	Post-test	Paired Samples t-test, P	Before Intervention	After Intervention	Paired Samples t-test, P
Pulse	8.035 \pm 77.36	6.048 \pm 76.87	0.027	7.105 \pm 78.49	7.248 \pm 78.47	1.000
Breathing	1.581 \pm 15.00	1.588 \pm 14.98	0.317	2.199 \pm 15.73	2.170 \pm 15.71	0.310
Systolic blood pressure	12.17 \pm 128.66	12.10 \pm 128.12	0.083	11.36 \pm 127.55	11.41 \pm 127.44	0.561
Diastolic blood pressure	65.6 \pm 66.76	6.60 \pm 76.22	0.317	5.75 \pm 76.22	5.75 \pm 76.22	1.000

Quarterly of
The Horizon of Medical Sciences

4. Discussion

The present study results suggested that red rose essential oil reduced the severity of apparent anxiety before surgery, i.e. consistent with other studies [5, 8, 12]. Moreover, the levels of apparent and latent anxiety in patients were moderate to high before the intervention. A study explored the effect of inhaled aromatherapy on the severity of patients' anxiety before surgery. Accordingly, the mean severity of apparent anxiety before surgery was moderate to high (51.00 ± 8.94) [13]. In Kohnegi's study, however, the mean score of apparent anxiety was relatively high. This discrepancy may be due to differences in the surgery type performed on patients undergoing coronary artery bypass graft surgery; it naturally results in more severe anxiety, compared to abdominal surgery [14].

It is recommended that studies be performed with a larger sample size; the effect of rose essential oil on other anxiety-generating interventions be considered, and other psychological variables, like stress, be assessed.

5. Conclusion

Factors, such as the intervention type, the therapeutic outcomes, patient's characteristics, family support, and insurance coverage also affect the severity of the patient's anxiety. These elements could impact the research results, i.e. beyond the researchers' control. Another study limitation was the impossibility of blinding the specimens and researchers, as well as the highly stressful preoperative condition, which may have complicated the studied patients' assessment of their anxiety severity.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

This project was approved by the Ethics Committee of the Regional Ethics Committee of Gonabad University of Medical Sciences (Code: IR.GMU.REC.1395.43). Moreover, all the instructions approved by this committee have been considered in this study.

Funding

The present research was funded by the Student Research Committee of Gonabad University of Medical Sciences.

Authors' contributions

Conceptualization: Samaneh Najafi, Moosa Sajjadi, Amirreza Nasirzadeh, Hossein Jedd; Methodology, Sa-

maneh Najafi, Moosa Sajjadi; Investigation: Hossein Jedd; Writing-original draft: Samaneh Najafi, Moosa Sajjadi, Amirreza Nasirzadeh, Hossein Jedd; Writing-review & editing: Samaneh Najafi, Moosa Sajjadi, Amirreza Nasirzadeh, Hossein Jedd; Funding acquisition: Samaneh Najafi, Moosa Sajjadi; Supervision: Samaneh Najafi, Moosa Sajjadi.

Conflicts of interest

The authors declared no conflicts of interest.

Acknowledgements

We express our gratitude for the support of the Vice-Chancellor for Research and Technology, as well as the Student Research Committee of Gonabad University of Medical Sciences and the esteemed staff of the surgical wards of Gonabad 15-Khordad Hospital and the patients who contributed to this research.

تأثیر رایحه‌درمانی استنشاقی با گل سرخ بر شدت اضطراب قبل از عمل جراحی شکم: یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی

سمانه نجفی^۱، موسی سجادی^۲، امیررضا نصیرزاده^۳، حسین جدی^۴

۱. گروه پرستاری داخلی جراحی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
۲. گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
۳. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
تاریخ پذیرش: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
تاریخ انتشار: ۱۳ فوریه ۱۳۹۹

هدف اضطراب قبل از عمل جراحی می‌تواند سبب افزایش درد پس از عمل، افزایش نیاز به مسکن و افزایش زمان اقامت بیمار در بیمارستان شود؛ بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رایحه‌درمانی استنشاقی با گل سرخ بر شدت اضطراب قبل از عمل جراحی شکم انجام شد.

مواد و روش این کارآزمایی بالینی روی ۹۰ بیمار تحت جراحی شکمی در بیمارستان ۱۵ خرداد بیخت در سال ۱۳۹۶ انجام شد. بیماران به روش تصادفی بلوک‌های جایگشتی به دو گروه مداخله و پلاسبو (هر گروه ۴۵ نفر) تقسیم شدند. اینزار پژوهش پرسشنامه استاندارد آشپیل برگ بود که بلاعده قابل و پس از مداخله در دو گروه تکمیل شد. در پایان داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶، با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های تی مستقل، زوجی و کای اسکوثر در سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ تحلیل شد.

یافته‌ها میانگین سنی بیماران در گروه مداخله و پلاسبو به ترتیب ۳۷ ± ۳ و ۳۱ ± ۳ و ۴۴ ± ۵ و ۴۰ ± ۵ بود. بیشترین نوع عمل در هردو گروه هرنیاپنگوینال بود. قبل از مداخله تفاوت آماری معنی‌داری بین دو گروه از نظر شدت اضطراب وجود نداشت ($P>0/05$)، اما بعد از مداخله تفاوت آماری از نظر شدت اضطراب آشکار و کل، معنی‌دار شد ($P<0/05$) و از نظر شدت اضطراب پنهان معنی‌دار نشد ($P>0/05$).

نتیجه‌گیری رایحه‌درمانی با گل سرخ در کاهش شدت اضطراب آشکار بیماران قبل از عمل جراحی مؤثر است و استفاده از آن به عنوان درمان مکمل، ارزان و غیرهای‌اجمی در بالین توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها:

گل سرخ، رایحه‌درمانی، استنشاقی، اضطراب، عمل جراحی

مقدمه

افزایش می‌یابد. برای مقابله با این موضوع از داروهای کاهنده شدت اضطراب استفاده می‌شود که مشکلاتی مانند فراموشی و خواب آلودگی طولانی مدت و اغلب سرکوب سیستم تنفسی به همراه دارند [۱]. علاوه بر آن باید قبل از عمل، تاریخچه پزشکی بیمار بررسی و رضایت‌وی در مورد آگاهی از عوارض این دارو اخذ شود، بنابراین داروهای ضداضطراب موارد مناسبی برای استفاده قبل از عمل نیستند. یک داروی ضداضطراب ایده‌آل باید کمترین عوارض جانبی را داشته باشد [۲].

روش‌های غیردارویی یا روش‌های مکمل اکثراً عوارض جانبی و خطرات کمی دارند و به تهایی یا همراه با سایر روش‌های دیگر قابل استفاده هستند. بسیاری از روش‌های غیردارویی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، در رده درمان‌های طب مکمل قرار دارند [۳]. یکی از درمان‌هایی که در مقایسه با سایر درمان‌های

اضطراب قبل از عمل به عنوان بخشی عادی از تجربه جراحی و معضلی فرآیند [۴] روی سلامت بیماران تأثیرگذار است [۵]. فاکتورهایی که ممکن است سبب افزایش شدت اضطراب در بیماران شوند شامل درد، محرومیت از خواب، دوری از خانه و خانواده و طولانی شدن روند درمان است [۶]. اضطراب به دلیل کاهش قدرت مقابله با عفونت‌ها، تأخیر در زمان ترمیم زخم‌ها و تشدید استرس می‌تواند بهبودی بیمار را به تعویق بیندازد [۷]. همچنین واکنش‌های قلبی عروقی، مصرف اکسیژن در میوکارد قلب، غلظت سرمی اپینفرین و نوراپینفرین و دُز مؤثر داروهای ضددرد و بیهوشی همگی بر اثر اضطراب افزایش می‌یابند [۸]. از آنجا که اضطراب دُز داروی بیهوشی مورد نیاز را زیاد می‌کند، بنابراین ریسک عدم برگشت بیمار بعد از بیهوشی نیز

* نویسنده مسئول:

حسین جدی

نشانی: گناباد، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

تلفن: ۰۴۰۰۲۷۵۷۵۰ (۵۱)

پست الکترونیکی: one_hossein@yahoo.com

توجهی دارد [۱۹]. در طب سنتی ایرانی نیز استفاده از گل سرخ برای بهبود دردهای میگرنی [۲۰]، دیسمونوره [۲۱]، دردهای اسکلتی عضلانی، تهوع صبحگاهی در زنان باردار، افسردگی و سندروم ملل پیش از قاعده‌گی توصیه شده است [۲۲]. از آنجا که ایران یکی از چهار کشور اول تولیدکننده گل سرخ در جهان است [۱۲]، این گیاه در ایران دسترس بوده و محبوبیت زیادی دارد و تهیه آن نیز هزینه‌بر نیست، بنابراین آرومترایپی با گل سرخ می‌تواند جایگزینی برای داروهای صناعی کاهش‌دهنده شدت اضطراب باشد [۱۴].

با توجه به اهمیت کاهش شدت اضطراب در بیماران قبل از عمل جراحی، عهده‌داری انجام مداخلات درمانی مکمل توسط پرستاران و خلاهایی که پیرامون تأثیر ضداضطرابی رایحه گل سرخ وجود دارد از یکسو و سهولت به کارگیری آرومترایپی در مقایسه با سایر روش‌های درمانی جایگزین نظیر طب سوزنی، هومیوپاتی و هیپنوتیزم از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا مطالعه حاضر را با هدف بررسی تأثیر آرومترایپی با انسان گل سرخ بر شدت اضطراب قبل از عمل جراحی شکم، انجام دهیم.

مواد و روش‌ها

این کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی روی ۹۰ بیمار تحت اعمال جراحی شکمی بستری در بیمارستان ۱۵ خرداد بیدخت شهرستان گناباد در سال ۱۳۹۶ انجام شد. ملاحظات اخلاقی رعایت‌شده در این پژوهش شامل اخذ تأییدیه از کمیته منطقه‌ای اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم‌پزشکی گناباد (کد GMU.REC.1395.43)، انجام هماهنگی‌های لازم با محیط پژوهش، کسب رضایت کتبی آگاهانه از آزمودنی‌ها، اطمینان دادن به نمونه‌ها از نظر محramانبودن اطلاعات شخصی آن‌ها و بیان نتایج به صورت کلی، اعلام به آزمودنی‌ها جهت آزاد بودن برای خروج از مطالعه در هر مرحله، اطلاع به آزمودنی‌ها در مورد امکان قرارگیری در هر دو گروه به طور تصادفی و ثبت پژوهش با کد IRCT2017092136309N1 در سایت کارآزمایی‌های بالینی ایران بود.

بیماران با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به روش تصادفی بلوک‌های جایگشتی چهارتایی به دو گروه پلاسبو و آرومترایپی استنشاقی با رایحه گل سرخ (هر گروه ۴۵ نفر) تقسیم شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول ذیل (مقایسه میانگین دو جامعه مستقل) با ضرب اطمینان ۹۵ درصد، خطای پنج درصد و توان آزمون ۸۰ درصد تعیین شد. پارامترهای اولیه بر اساس مطالعه مشابه [۲۳] در فرمول شماره ۱ جایگزین شد و ۴۰ نفر برای هر گروه تعیین شد که با در نظر گرفتن احتمال ریزش ۱۰ درصد، به ۴۵ نفر در هر گروه افزایش یافت.

$$1. n = \frac{(Z_{\alpha/2} + Z_{\beta})^2 (S_1^2 + S_2^2)}{(\mu_1 - \mu_2)^2} = \frac{7.84 \times (6.1^2 + 5.5^2)}{(22.5 - 18.85)^2} \approx 40$$

طب مکمل در رابطه با شدت اضطراب در سال‌های اخیر در اکثر کشورها رشد چشمگیر داشته است، آرومترایپی است. مکانیسم عمل انسان‌های روغنی از چندین طریق است؛ اول اینکه این انسان‌ها، رسپتورهای واقع در پیاز بویایی را تحریک کرده و پیام بویایی را به دستگاه لیمیک منتقل می‌کند. سیستم لیمبیک مرکز احساسی مغز است و روی ضربان نبض، فشار خون، سیستم تنفسی و پاسخ به استرس مؤثر است [۶].

مکانیسم دیگر رایحه‌درمانی از طریق جذب پوستی است. مولکول‌های انسان روغنی حامل به اندازه‌های کوچک هستند که از طریق سد پوستی در عرض ۴۰-۲۰ [۱۰]. تحقیقات مختلف نشان داده است که آرومترایپی می‌تواند در کاهش شدت اضطراب، درد، خستگی و بهبود رژم‌های پوستی مؤثر باشد. اما این تأثیرات به صورت دقیق اثبات نشده و مکانیسم دقیق چگونگی اثرگذاری آرومترایپی به صورت کامل شناخته نشده است [۱۱].

مقبولیت بیشتر و عوارض جانبی کمتر روش‌های غیردارویی بهویژه محصولات گیاهی در مقایسه با داروهای شیمیایی سبب شده امروزه مصرف آن‌ها در بین مردم گسترش یافد [۱۲]. گل سرخ یکی از گیاهانی است که خواص درمانی متعدد داشته و در آرومترایپی کاربرد دارد. گزارش شده که این گیاه دارای خاصیت آرامبخش، ضددرد، آنتی‌اسکیدان، آنتی‌باتکریال و ضدیابتیک است. اجزای اصلی تشکیل‌دهنده انسان گل سرخ شامل فنتیل الکل، سیترونول، لینالول و ژرانیول هستند. بخش عمده خواص درمانی گل سرخ به ترکیبات فنولی آن مربوط می‌شود که در برگ‌یرنده طیف وسیعی از فعالیت‌های فارماکولوژیکی مانند خواص آنتی‌اسکیدانی، ضدسرطان، تصفیه کردن بدن از حضور رادیکال‌های آزاد، ضدالتهاب، آنتی‌موتاسیون و ضدافسردگی است و انسان حاصل از تقطیر گلبرگ‌های گل سرخ در آرومترایپی کاربرد دارد [۱۳].

مطالعات قبلی نشان داده انسان گل سرخ اثر ضدافسردگی دارد و می‌تواند در درمان افسردگی پس از زایمان و علائم سندرم پیش از قاعده‌گی مؤثر باشد. تاکنون عارضه خاصی در ارتباط با استفاده از انسان گل سرخ به منظور کاهش شدت همچنین استفاده از انسان گل سرخ به تشنجه کاهش شدت اضطراب مادران و شیرخواران مؤثر و بدون عوارض جانبی بوده است [۱۴، ۱۵]. برخی مطالعات نشان دادند گل سرخ از طریق اثرگذاری روی سیستم عصبی مرکزی در کاهش علائم ترک مورفین نقشی مؤثر داشته و باعث مقابله با تشنجه، افسردگی و اضطراب می‌شود [۱۶، ۱۷].

نتایج بررسی‌های انجام‌شده توسط محبی‌تبار و همکاران نیز اثر ضداضطراب به همراه فواید آرامبخشی و ضددرد فیزیولوژیکی و روان‌شناسنگی این گیاه را تأیید کرد [۱۸]. انسان گل سرخ در کاهش اضطراب زنان نولیپار در فاز فعل زایمان کارایی قابل

بیانگر افزایش نمره اضطراب است؛ بدین صورت که کسب نمره بین ۲۰ تا ۳۱ اضطراب خفیف، ۳۲ تا ۶۴ اضطراب متوسط و ۶۴ تا ۸۰ اضطراب شدید را نشان می‌دهد. پس از جمعبندی امتیازات کسب شده، این پرسشنامه به صورت گسترهای توسعه روآن‌شناسان، متخصصان و محققان استفاده شده است و اعتبار و اعتماد ترجمه فارسی آزمون اشپیل برگر توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی انتیتو روآن‌پزشکی تهران مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است [۲۳] و ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده برای پایایی آن نیز ۰/۹۲ است [۲۴].

پژوهشگران پس از کسب اجازه از مسئولین ذی‌ربط و گرفتن رضایت آگاهانه، ضمن توضیح اهداف مطالعه برای بیماران، با لحاظ معیارهای ورود، با استفاده از پرسشنامه استاندارد سنجش شدت اضطراب موقعیتی اشپیل برگر میزان اضطراب آن‌ها را سنجیدند. در صورتی که نمره اضطراب بیشتر از ۲۰ بود، فرم خصوصیات جمعیت‌شناختی و فرم مربوط به اطلاعات بیماری تکمیل و علائم حیاتی بیمار ثبت شد.

با توجه به اینکه بیمار در کدام گروه قرار می‌گرفت، مداخله بدین صورت انجام شد که در گروههای آرومترابی استنشاقی دو قطره [۲۵] از اسانس گل سرخ روی یک دستمال ریخته و از بیمار خواسته شد از فاصله ۱۰-۷ سانتی‌متری و به مدت ۲۰ دقیقه آن را استنشاق کند. اسانس گل سرخ مورد استفاده در این پژوهش با غلظت چهار درصد توسط شرکت باریج اسانس تهیه شد. با توجه به بُوی رایحه گل سرخ امکان کورسازی مطالعه از طرف پژوهشگر و نمونه‌ها به صورت یکسو یا دوسوکر وجود نداشت. به علت پخش سریع رایحه گل سرخ در محیط، مداخله در دو گروه، در دو اتاق کاملاً مجزا با شرایط فیزیکی کاملاً یکسان انجام شد. در گروه پلاسیو دو قطره آب را روی یک دستمال ریخته و از بیمار خواسته شد از فاصله ۱۰-۷ سانتی‌متری و به مدت ۲۰ دقیقه آن را استنشاق کند.

دلیل انتخاب آب به عنوان پلاسیو نداشتند، بو، عطر و رایحه بود و در مطالعات مشابه نیز آب به عنوان پلاسیو استفاده شده است [۱۴، ۲۵]. گروههای مطالعه، از نظر متغیرهای مداخله‌گری همچون سن، جنس، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، سابقه عمل جراحی و نوع عمل جراحی همسان‌سازی شدند (*تصویر شماره ۱*). تکمیل پرسشنامه اضطراب موقعیتی اشپیل برگر و ثبت علائم حیاتی بیماران نیز بلافاصله قبل و بعد از مداخله صورت گرفت. فاصله زمانی بین مداخله و رفتن فرد به اتاق عمل نیز یک ساعت بود (انجام مداخله یک ساعت قبل از رفتن به اتاق عمل) و بیماران دو گروه از این لحاظ نیز همسان بودند، زیرا همسان‌سازی از نظر نوع جراحی انجام شده بود.

پس از پایان نمونه‌گیری، داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ و به کمک آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی مطلق و نسبی) و آزمون‌های آمار تحلیلی نظریتی مستقل و

معیارهای ورود به این مطالعه شامل داشتن سن بیشتر از ۱۸ سال، کسب نمره بالاتر از ۲۰ پاز پرسشنامه اشپیلبرگر، عدم استفاده از سایر روش‌های کاهش شدت اضطراب مانند آرامسازی و موسیقی‌درمانی، قادر بودن به فهم و تکلم به زبان فارسی، داشتن سواد خواندن و نوشتن، عدم ساقه اگرما و ساقه آلرژی نسبت به گل سرخ (گل محمدی)، عدم اختلال در بیوایی، عدم ساقه میگرن و سردردهای مزمن، عدم بیماری فعال روانی طبق تشخیص پزشک، عدم مصرف داروهای روان و یا هرگونه مسکن و ضد درد بود. همچنین در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری در پژوهش، بروز هرگونه اثری دال بر واکنش آرژیک نسبت به اسانس مورداستفاده، درد حاد در زمان تکمیل پرسشنامه، استفاده از بنزو دی‌یازین‌ها، داروهای آرامبخش و مخدور در طول مداخله، بیماران از مطالعه خارج می‌شدند.

گرداوری داده‌ها از طریق مصاحبه (در مواردی که مددجویان نداشتند شخصاً پرسشنامه‌های اضطراب و اطلاعات جمعیت‌شناختی را تکمیل کنند، داده‌ها به روش مصاحبه گرداوری شد)، تکمیل پرسشنامه توسط خود بیمار و ثبت علائم حیاتی صورت گرفت. در این پژوهش ابزار گرداوری داده‌ها شامل سه بخش بود؛ بخش اول شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه عمل جراحی، وضعیت تأهل، میزان درآمد، محل زندگی، شغل، تعداد افراد خانواده و نوع عمل جراحی) بود. این بخش، فاکتورهای مداخله‌گر را در برگرفته و بر اساس مطالعات مرتبط تنظیم شده است. جهت سنجش اعتبار علمی این قسمت از پرسشنامه، از روش اعتبار محتوا استفاده شد. بخش دوم چکلیست ثبت علائم حیاتی (نبض، تنفس، درجه حرارت و فشار خون) بود.

برای اندازه‌گیری درجه حرارت و فشار خون به ترتیب از دماستج دهانی امسيگ، مدل CFO2 و دستگاه فشارسنج عقربه‌ای و گوشی پزشکی مدل ALPK2 ساخت کشور ژاپن برای تمام بیماران استفاده شد. به منظور افزایش پایایی ابزار، قبل از استفاده از ابزارها و به تناوب در طی مطالعه با یک دماستج دهانی استاندارد، فشارسنج عقربه‌ای و گوشی پزشکی استاندارد، پایایی ابزارها ارزیابی شد. شمارش تعداد تنفس و نبض بیمار نیز در طی یک دقیقه انجام و ثبت شد. بخش سوم پرسشنامه استاندارد اضطراب موقعیتی اشپیل برگر (شامل دو بخش جداگانه پنهان و آشکار) بود؛ بخش اول پرسشنامه اشپیل برگر شامل ۲۰ عبارت برای تعیین اضطراب آشکار و بخش دوم نیز شامل ۲۰ عبارت برای تعیین شدت اضطراب پنهان است. منظور از شدت اضطراب آشکار، احساس فرد در همان لحظه و منظور از شدت اضطراب پنهان، احساس معمول فرد در بیشتر اوقات است.

سؤالات بر اساس مقیاس لیکرت چهار درجه‌های از یک تا چهار سنجش شدند. مجموع نمرات هریک از دو مقیاس اضطراب آشکار و پنهان در دامنه ۲۰ تا ۸۰ قرار دارد. افزایش نمره کسب شده

کل و آشکار در هر دو گروه قبل و بعد از مداخله اختلاف معنادار داشت (**جدول شماره ۲**).

بر اساس آزمون تی مستقل شاخص نبض در بیماران گروه گل سرخ قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری داشت. میانگین سایر شاخص‌های همودینامیک در دو گروه گل سرخ و دارونما قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معنادار نداشت (**جدول شماره ۳**).

بر اساس نتایج ارتباط آماری معنی‌داری بین جنس، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، شغل و درآمد واحدهای پژوهش با نمره اضطراب آشکار، پنهان و کل قبل از مداخله وجود نداشت ($P > 0.05$). در طی مداخله نیز هیچ‌گونه عارضه و مشکلی توسط بیماران گزارش نشد.

بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که گل سرخ شدت اضطراب آشکار قبل از عمل جراحی را کاهش می‌دهد که این یافته‌ها هم‌راستا با مطالعات دیگر است [۱۴، ۱۹، ۲۶]. آروماترایپ می‌تواند مسیرهای موجود در دستگاه لیمبیک و هیپوپotalamos را تحریک

زوجی و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد. سطح معناداری کمتر از 0.05 لحاظ شد.

یافته‌ها

نمونه‌های این پژوهش را ۹۰ نفر بیمار کاندیدای عمل جراحی شکمی در دو گروه آرومترایپ استنشاقی با گل سرخ و پلاسبو تشکیل می‌دادند. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که دو گروه از نظر سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، نوع عمل جراحی و سابقه جراحی اختلاف آماری معنی‌داری نداشته (۰.۰۵) و همسان هستند (**جدول شماره ۱**).

آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین نمره اضطراب کل، آشکار و پنهان بین دو گروه گل سرخ و پلاسبو قبل از مداخله تفاوت آماری معناداری نداشته است ($P = 0.139$)، اما بعد از مداخله میانگین نمره اضطراب کل و آشکار به طور معناداری کمتر از گروه پلاسبو بود ($P = 0.011$). همچنانی بر اساس آزمون تی زوجی، اختلاف معناداری در میانگین نمره اضطراب پنهان قبل و بعد از مداخله در گروه دارونما یافت نشد؛ در حالی که این اختلاف در گروه گل سرخ معنادار بود. میانگین نمره اضطراب

جدول ۱. مقایسه اطلاعات جمعیت‌شناختی واحدهای پژوهش در دو گروه مورد مطالعه

آزمون آماری P	میانگین \pm انحراف معیار / (درصد)			اطلاعات جمعیت‌شناختی	گروه
	دارونما	گلسرخ	سن (سال)		
تی مستقل $P = 0.07$	$44/51 \pm 15/65$	$37/13 \pm 12/35$			
کای اسکوئر $P = 0.80$	(۶۴/۵) ۲۹ (۳۵/۵) ۱۶	(۴۰) ۲۷ (۴۰) ۱۸	مرد زن	جنس	تعداد (درصد)
کای اسکوئر $P = 0.39$	(۸۲/۲) ۳۷ (۱۷/۸) ۸	(۸۳/۵) ۳۸ (۱۵/۵) ۷	متاهل مجرد	وضعیت تأهل	تعداد (درصد)
	(۲۲/۲) ۱۰	(۲۲/۲) ۱۰	ابتداي		
کای اسکوئر $P = 0.99$	(۲۶/۶) ۱۲ (۴۰/۱) ۱۸ (۱۱/۱) ۵	(۳۱/۱) ۱۴ (۳۵/۶) ۱۶ (۱۱/۱) ۵	سيكل ديليم دانشگاهي	سطح تحصيلات	تعداد (درصد)
کای اسکوئر $P = 0.82$	(۵۱/۱) ۲۳ (۴۸/۹) ۲۲	(۴۲/۲) ۱۹ (۵۷/۸) ۲۶	دارد نثارد	سابقه عمل جراحی	تعداد (درصد)
کای اسکوئر $P = 0.50$	(۲۴/۴) ۱۱ (۲۶/۶) ۱۲ (۴۹) ۲۲	(۱۵/۵) ۷ (۲۳/۳) ۱۵ (۵۱/۲) ۲۳	کله سيسكتومي آپاندكتومي هرنی اينگونیال	نوع عمل جراحی	تعداد (درصد)

جدول ۲. مقایسه اضطراب پنهان و آشکار در دو گروه قبل و بعد از مداخله

درون گروهی		بین گروهی		(میانگین ± انحراف معیار)	گروه‌ها	فاز مطالعه	اضطراب
آزمون آماری (P)	P	آزمون آماری					
گروه گل سرخ		گروه پلاسبو		۵۱/۰۵±۴۴/۷	گل سرخ		
تی مستقل	P=۰/۰۷۹			۴۷/۷±۶۴/۵۶	قبل از مداخله		
تی زوجی P<۰/۰۰۱		تی زوجی P=۰/۰۰۵		۶۹/۹۴±۴۲/۷	گل سرخ		آشکار
	P=۰/۰۰۵	تی مستقل		۹۷/۴۳±۴۶/۷	بعد از مداخله		
				پلاسبو	پلاسبو		
				۲۴/۲۸±۴۵/۸	گل سرخ		
	P=۰/۱۷۵	تی مستقل		۶۴/۵۷±۴۸/۹	قبل از مداخله		
تی زوجی P=۰/۰۸		تی زوجی P<۰/۰۰۱		۲۴/۳۲±۴۴/۸	گل سرخ		پنهان
	P=۰/۰۶۸	تی مستقل		۴۷/۵۵±۴۸/۹	بعد از مداخله		
				پلاسبو	پلاسبو		

افق دانش


جدول ۳. مقایسه علائم حیاتی بیماران در دو گروه قبل و بعد از مداخله

دارونما		گل سرخ				گروه
آزمون تی زوجی P	فاز علائم حیاتی					
P=۱/۰۰۰	۷۸/۳۷±۷/۲۴۸	۷۸/۴۹±۷/۱۰۵	P=۰/۰۲۷	۷۶/۸۷±۶/۰۴۸	۷۷/۳۶±۶/۰۳۵	نبض
P=۰/۳۱۰	۱۵/۷۱±۲/۱۷۰	۱۵/۷۳±۲/۱۹۹	P=۰/۳۱۷	۱۴/۹۸±۱/۵۸۸	۱۵/۰۰±۱/۵۸۱	تنفس
P=۰/۵۶۱	۱۲۷/۴۴±۱۱/۴۱	۱۲۷/۵۵±۱۱/۳۶	P=۰/۰۸۳	۱۲۸/۱۲±۱۲/۱۰	۱۲۸/۶۶±۱۲/۱۷	فشارخون سیستولیک
P=۱/۰۰۰	۷۶/۲۲±۵/۷۵	۷۶/۲۲±۵/۷۵	P=۰/۳۱۷	۷۶/۲۲±۶/۶۰	۷۶/۶۶±۶/۶۵	فشارخون دیاستولیک

افق دانش

ضد اضطرابی، اثرات آرامبخشی نیز دارد [۱۸]. دو ترکیب اصلی تشکیل‌دهنده انسانس گل سرخ، گرانیول و سیترنول هستند که از طریق گیرنده‌های دوبامین سروتونین سیستم عصبی به کاهش استرس و شدت اضطراب کمک می‌کنند [۲۸]. بر اساس جستجوها، پژوهشی که به بررسی اثر گرانیول و سیترنول بر شدت اضطراب قبل از عمل پرداخته باشد، یافت نشد. اگرچه یک مطالعه روی موش‌هایی که افسردگی به آن‌ها القا شده بود نشان

کند و منجر به کاهش آزادسازی هورمون کورتیکوتیروپین شود. کاهش آزادسازی این هورمون توسط هیپوفیز سبب کم شدن تولید کورتیزول در غدد فوق کلیوی می‌شود که تمام عوامل فوق باعث کاهش شدت اضطراب خواهند شد [۲۹]. آرماتراپی با گل سرخ تحریک‌پذیری سیستم عصبی سمپاتیک را کاهش داده و بدین ترتیب شدت اضطراب را کاهش و حس آرامش، امنیت و رضایتمندی را افزایش می‌دهد [۲۷]. گل سرخ در کنار خاصیت



افق دانش

شدت اضطراب بیشتری نسبت به اعمال جراحی شکمی به همراه دارد. تفاوت در میانگین سنی در این مطالعه به میزان قابل توجهی بالاتر از میانگین سنی در مطالعه حاضر بود. همچنان در وضعیت اشتغال و سطح تحصیلات بیشترین درصد واحدهای موردپژوهش بی سواد بودند، ولی در مطالعه حاضر بیشترین درصد واحدهای موردپژوهش دارای مدرک تحصیلی دیپلم بودند [۳۲].

در ارتباط با تعیین شدت اضطراب، بلافضله پس از مداخله در هریک از دو گروه گل سرخ و دارونما مشخص شد میانگین نمره اضطراب کل بین دو گروه بلافضله پس از مداخله همچنان متوسط به بالا بود. بعد از مداخله نیز میانگین نمره اضطراب آشکار گروه گل سرخ بلافضله پس مداخله، کاهش یافته و متوسط به پایین شده بود. میانگین نمره اضطراب پنهان بین دو گروه بلافضله پس مداخله، تغییر محسوسی نداشت و میانگین شدت اضطراب متوسط به بالا بود. این نتایج با یافتههای بایشاهی و همکاران مطابقت نداشت و در مطالعه آنها میانگین اضطراب بعد از مداخله متوسط به پایین بود [۲۹] که این عدم تطابق می‌تواند به دلیل تفاوت در نوع مداخله به کار گرفته شده باشد.

تصویر ۱. نمودار فرایند اجرا (بر اساس معیار CONSORT)

داد گل سرخ با افزایش آنتی اکسیدان‌ها و کاهش لیپید پروکسیداز توانسته استرس اکسیداتیو در افسردگی را کم کند [۱۷]. این اثر به تحریک سیستم لیمبیک توسط مولکول‌های استنشاق شده و تأثیر مستقیم آن‌ها بر حافظه و احساسات مدولاسیون مربوط می‌شود که شدت اضطراب را کاهش می‌دهند [۲۸] به علاوه یک ارتباط مسقیم بین درد و شدت اضطراب وجود دارد، بنابراین اثر اثبات شده گل سرخ در کاهش درد به کاهش اضطراب بیماران منجر خواهد شد [۱۴].

نتایج نشان داد سطوح اضطراب آشکار و پنهان در بیماران قبل از مداخله متوسط به بالا بود. در مطالعه‌های که تحت عنوان «تأثیر آرومترابی استنشاقی بر شدت اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی» انجام شد، محققین دریافتند که میانگین شدت اضطراب آشکار قبل از عمل جراحی، متوسط به بالا ($51/100 \pm 8/94$) است [۲۹] و همچنان در مطالعات ظفرنیا و همکاران و ذاکری مقدم و همکاران نتایج مشابهی به دست آمد [۳۰، ۳۱] ولی در مطالعه کهنه‌گی میانگین نمره اضطراب آشکار نسبتاً شدید بود که این تفاوت می‌تواند به دلیل تفاوت در نوع عمل جراحی و مربوط به بیماران قبل از عمل جراحی پیوند عرقی کرونر باشد که طبیعتاً

نتیجه‌گیری

در مجموع این مطالعه نشان داد رایحه‌درمانی استنشاقی با انسانس گل سرخ می‌تواند بر کاهش شدت اضطراب قبل از عمل جراحی مؤثر باشد. بنابراین استفاده از آن به منظور کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی به عنوان درمان مکمل و یک روش آسان، ارزان، بی‌خطر و غیرتهاجمی در بالین توصیه می‌شود. همچنین علاوه بر عدم تداخل با روند درمانی بیمار و سادگی قابل اجرای این روش و قابلیت انجام آن برای پرستاران و حتی همراهان بیماران، می‌توان با این روش نتایج قابل ملاحظه‌ای در کاهش شدت اضطراب بیماران کسب کرد و موجب بهبود مراقبت از بیماران شد.

از محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به ارتباط بین بوها و احساسات و تجارب قبلی مواجه شدن با این بوها که می‌تواند بر نتایج تأثیر بگذارد اشاره کرد. همچنین با توجه به اینکه شدت اضطراب یک پدیده ذهنی است، پاسخ افراد هم به آن ذهنی است. از طرفی عواملی مثل درمان‌های مربوطه، نتایج این درمان‌ها، شخصیت افراد و حمایت خانواده و پوشش‌های بیمه‌ای نیز روی شدت اضطراب بیماران مؤثر است که این عوامل می‌تواند روی نتیجه پژوهش اثر بگذارد که کنترل آن‌ها از اختیار پژوهشگر خارج بود. ناتوانی در کورسازی نمونه‌ها و پژوهشگران و نیز شرایط بسیار استرس‌زا قبل از عمل که ممکن است بیماران را در ارزیابی شدت اضطراب‌شان دچار مشکل کرده باشد نیز جزو محدودیت‌های این پژوهش محسوب می‌شوند. همچنین طولانی بودن پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر و تکمیل آن در چند مرحله ممکن است موجب عدم همکاری و خستگی واحدهای مورد پژوهش شده باشد.

ملاحظات اخلاقی

پیروی از اصول اخلاق پژوهش

طرح دارای کد کمیته اخلاق به شماره IR.GMU.REC.1395.43 از کمیته منطقه‌ای اخلاق دانشگاه علوم پزشکی گناباد است و کلیه دستورالعمل‌های مصوب این کمیته در جریان انجام مطالعه لحاظ شده است. پروتکل این مطالعه در مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایران با شماره IRCT2017092136309N1 به ثبت رسیده است.

حامي مالي

این پژوهش با حمایت مالی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شده است.

تصور می‌شود دلیل این تناقض کمتر بودن حجم نمونه و مقاطع زمانی اندازه‌گیری متغیرها در مطالعه موردنظر بوده است. در مطالعه داگلی و همکاران نیز کارایی انسانس گل سرخ به منظور کاهش اضطراب قبل عمل بررسی شد و نتایج نشان داد این مداخله توانسته به طور مؤثر و معناداری میانگین نمره اضطراب بیماران کاندیدای عمل جراحی سپتورینوپلاتی را کاهش دهد [۳۳]. در حالی که در مطالعه فضل‌الله‌پور و همکاران تأثیر آرومترایی استنشاقی با انسانس گل سرخ روی شدت اضطراب بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد این مداخله برخلاف مطالعه ما نتوانست شدت اضطراب پنهان و آشکار را به طور معناداری در گروه مداخله کاهش دهد [۳۴].

در ارتباط با مقایسه علائم حیاتی قبل و بعد از مداخله در هریک از دو گروه گل سرخ و دارونما نتایج مطالعه نشان داد میانگین تعداد نبض در گروه دارونما قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری نداشت، ولی در گروه گل سرخ قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری داشت، بنابراین رایحه‌درمانی استنشاقی با گل سرخ بر میانگین تعداد نبض مؤثر بود و باعث کاهش میانگین تعداد نبض شد که به نظر می‌رسد علت احتمالی آن کاهش شدت اضطراب پس از آرومترایی باشد. میانگین تعداد تنفس، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه دارونما و گل سرخ قبل و بعد از مداخله، تفاوت آماری معناداری نداشت؛ به این معنا که رایحه‌درمانی استنشاقی با گل سرخ تأثیری در میانگین تنفس، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ندارد. در مطالعه باباشهی و همکاران که تأثیر ماساژ و آرومترایی استنشاقی بر شدت اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی را بررسی کرده بودند نتایج حاکی از آن بود که اختلاف آماری معناداری از نظر اختلاف میانگین فشار خون سیستولیک قبل و بعد از مداخله وجود داشت که این نتایج با یافته‌های ما هم‌راستا نیست که دلیل آن ممکن است استفاده از انسانس اسطوخودوس باشد. در حالی که در این مطالعه از گل سرخ استفاده شد، ولی از لحظه تعداد نبض، تنفس و میانگین فشار خون دیاستولیک قبل و بعد از مداخله اختلاف آماری معناداری وجود نداشت که با نتایج مطالعه حاضر هم‌خوانی دارد.

تعیین ارتباط شدت اضطراب با مشخصات جمعیت‌شناختی و بیماری نشان داد که میانگین نمره اضطراب کل، آشکار و پنهان تحت تأثیر سن، جنس، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، وضعیت درآمد، شغل و نوع عمل جراحی نیست و نتایج آماری تفاوت آماری معناداری را در این رابطه نشان نداد. در مطالعه باباشهی و همکاران نتایج با مطالعه حاضر همسو بود و نشان داد میانگین نمره اضطراب کل، آشکار و پنهان تحت تأثیر مشخصات جمعیت‌شناختی سن، جنس، میزان درآمد ماهانه، میزان تحصیلات، شغل، محل سکونت، وضعیت تأهل نیست و نتایج آماری تفاوت آماری معناداری را در این رابطه نشان نداد [۲۹].

مشارکت نویسنده‌گان

مفهوم‌سازی: سمانه نجفی، موسی سجادی، امیررضا نصیرزاده،
 حسین جدی؛ روش‌شناسی: سمانه نجفی، موسی سجادی؛
 تحقیق: حسین جدی؛ نگارش-پیش نویس اصلی: سمانه نجفی،
 موسی سجادی، امیررضا نصیرزاده، حسین جدی؛ نگارش-بررسی
 و ویرایش: سمانه نجفی، موسی سجادی، امیررضا نصیرزاده،
 حسین جدی؛ حمایت مالی: سمانه نجفی، موسی سجادی؛
 بررسی نهایی: سمانه نجفی، موسی سجادی.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسنده‌گان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از حمایت معاونت تحقیقات و فناوری و نیز
 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد،
 پرسنل محترم بخش‌های جراحی بیمارستان ۱۵ خرداد گناباد
 و بیماران معززی که در این تحقیق، همکاری لازم را مبذول
 داشتند، کمال تشکر و سپاس را داریم.

References

- [1] Burg MM, Benedetto MC, Rosenberg R, Soufer R. Presurgical depression predicts medical morbidity 6 months after coronary artery bypass graft surgery. *Psychosomatic Medicine*. 2003; 65(1):111-8. [DOI:10.1097/01.PSY.0000038940.33335.09] [PMID]
- [2] Bailey L. Strategies for decreasing patient anxiety in the perioperative setting. *AORN Journal*. 2010; 92(4):445-60. [DOI:10.1016/j.aorn.2010.04.017] [PMID]
- [3] Seifi Z, Beikmoradi A, Oshvandi K, Poorolajal J, Araghchian M, Safaryan R. The effect of lavender essential oil on anxiety level in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery: A double-blinded randomized clinical trial. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*. 2014; 19(6):574-80. [PMID] [PMCID]
- [4] Rahmani Bilondi R, Najafi S, Banafsheh E, Abdolazimi Z, Tavafi M, Rahmani MR. [The effect of relaxation training using short message service on pregnant women's anxiety (Persian)]. *Iranian Journal of Nursing Research*. 2019; 14(1):42-9. [DOI:10.21859/jnir.140107]
- [5] Biddiss E, Knibbe TJ, McPherson A. The effectiveness of interventions aimed at reducing anxiety in health care waiting spaces: A systematic review of randomized and nonrandomized trials. *Anesthesia & Analgesia*. 2014; 119(2):433-48. [DOI:10.1213/ANE.0000000000000294] [PMID]
- [6] Patel SB, Kress JP. Sedation and analgesia in the mechanically ventilated patient. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. 2012; 185(5):486-97. [DOI:10.1164/rccm.201102-0273CI] [PMID]
- [7] Franco L, Blanck TJ, Dugan K, Kline R, Shammugam G, Galotti A, et al. Both lavender fleur oil and unscented oil aromatherapy reduce preoperative anxiety in breast surgery patients: A randomized trial. *Journal of Clinical Anesthesia*. 2016; 33:243-9. [DOI:10.1016/j.jclinane.2016.02.032] [PMID]
- [8] Bettoli A, Lombardi N, Marconi E, Crescioli G, Bonaiuti R, Maggini V, et al. The use of complementary and alternative medicines during breastfeeding: Results from the Herbal supplements in Breastfeeding Investigation (HaBIT) study. *British Journal of Clinical Pharmacology*. 2018; 84(9):2040-7. [DOI:10.1111/bcp.13639] [PMID] [PMCID]
- [9] Abdelhakim AM, Hussein AS, Doheim MF, Sayed AK. The Effect of inhalation aromatherapy in patients undergoing cardiac surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Complementary Therapies in Medicine*. 2019; 48(12):e102256. [DOI:10.1016/j.ctim.2019.102256]
- [10] Micozzi MS. Fundamentals of complementary, alternative, and integrative medicine. 6th ed. St. Louis: Elsevier Health Sciences; 2018. <https://books.google.com/books?id=sRyDwAAQBAJ&dq>
- [11] Kyle G. Evaluating the effectiveness of aromatherapy in reducing levels of anxiety in palliative care patients: Results of a pilot study. *Complementary Therapies in Clinical Practice*. 2006; 12(2):148-55. [DOI:10.1016/j.ctcp.2005.11.003] [PMID]
- [12] Afshar M, Sattari Fard H, Shadi M, Ghaderi R. [Repairing effects of Iran flora on wound healing (Persian)]. *Journal of Birjand University of Medical Sciences*. 2015; 22(1):1-18. <http://journal.bums.ac.ir/article-1-1788-en.html>
- [13] Boskabady MH, Shafei MN, Saberi Z, Amini S. Pharmacological effects of Rosa damascena. *Iranian Journal of Basic Medical Sciences*. 2011; 14(4):295-307. [PMID] [PMCID]
- [14] Hamdamian S, Nazarpour S, Simbar M, Hajian S, Mojtaba F, Talebi A. Effects of aromatherapy with Rosa damascena on nulliparous women's pain and anxiety of labor during first stage of labor. *Journal of Integrative Medicine*. 2018; 16(2):120-5. [DOI:10.1016/j.joim.2018.02.005] [PMID]
- [15] Marofi M, Sirousfard M, Moeini M, Ghanadi A. Evaluation of the effect of aromatherapy with Rosa damascena Mill. on postoperative pain intensity in hospitalized children in selected hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2013: A randomized clinical trial. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*. 2015; 20(2):247-54. [PMID] [PMCID]
- [16] Abbasi Maleki N, Abbasi Maleki S, Bekhradi R. Suppressive effects of Rosa damascena essential oil on naloxone-precipitated morphine withdrawal signs in male mice. *Iranian Journal of Pharmaceutical Research*. 2013; 12(3):357-61. [PMID] [PMCID]
- [17] Naziroğlu M, Koçlu S, Yorgancıgil E, Uğuz AC, Karakuş K. Rose oil (from Rosa x damascena Mill.) vapor attenuates depression-induced oxidative toxicity in rat brain. *Journal of Natural Medicines*. 2013; 67(1):152-8. [DOI:10.1007/s11418-012-0666-7] [PMID]
- [18] Mohebitabar S, Shirazi M, Bioos S, Rahimi R, Malekshahi F, Nejatbakhsh F. Therapeutic efficacy of rose oil: A comprehensive review of clinical evidence. *Avicenna Journal of Phytomedicine*. 2017; 7(3):206-13. [PMID] [PMCID]
- [19] Kheirkhah M, Vali Pour NS, Nisani L, Haghani H. Comparing the effects of aromatherapy with rose oils and warm foot bath on anxiety in the first stage of labor in nulliparous women. *Iranian Red Crescent Medical Journal*. 2014; 16(9):e14455. [DOI:10.5812/ircmj.14455] [PMID] [PMCID]
- [20] Niazi M, Hashempur MH, Taghizadeh M, Heydari M, Sharif A. Efficacy of topical Rose (Rosa damascena Mill.) oil for migraine headache: A randomized double-blinded placebo-controlled cross-over trial. *Complementary Therapies in Medicine*. 2017; 34:35-41. [DOI:10.1016/j.ctim.2017.07.009] [PMID]
- [21] Davari M, Reihani M, Khoshrang N. [The aromatherapy effect of rosemary and lavender on primary dysmenorrhea: A clinical controlled trial (Persian)]. *Journal of Isfahan Medical School*. 2014; 32(290):929-37. <http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/view/3157>
- [22] Najaf Najafi M, Hadavi F, Vazirinasab Kermani Sh, Vafisani F, Ghazanfarpour M. Aromatherapy with Iranian herbal medicines for premenstrual syndrome and primary dysmenorrhea: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Pediatrics*. 2019; 7(9):10155-66. [DOI:10.22038/IJP.2019.42455.3563]
- [23] Tahmasbi H, Mahmoodi Gh, Mokhberi V, Hassani S, Akbarzadeh H, Rahnamai N. The impact of aromatherapy on the anxiety of patients experiencing coronary angiography. *Zahedan Journal of Research in Medical Sciences*. 2012; 14(3):51-5. <https://www.researchgate.net/publication/278001811>
- [24] Ayik C, Özden D. The effects of preoperative aromatherapy massage on anxiety and sleep quality of colorectal surgery patients: A randomized controlled study. *Complementary Therapies in Medicine*. 2018; 36:93-9. [DOI:10.1016/j.ctim.2017.12.002] [PMID]
- [25] Moradi Kh, Ashtarian H, Darabi F, Hashemian AH, Saifi F. [A survey on the effects of Lavender aromatherapy on the anxiety and vital signs of patients with ischemic heart diseases hospitalized in cardiac intensive care units (Persian)]. *Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences*. 2016; 4(4):301-10. <http://5.63.15.58/attachmentsjson/download.action?masterCode=17354>
- [26] Nikfarjam M, Bahmani M, Heidari-Soureshjani S. Phytotherapy for anxiety in Iran: A review of the most important anti-anxiety medicinal plants. *Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences*. 2016; 9(3):1235-41. <http://eprints.skums.ac.ir/933/>
- [27] Heidari-Fard S, Amir Ali-Akbari S, Rafiee A, Mojtaba F, Shakeri N, Simbar M. Investigating the effect of chamomile essential oil on reducing anxiety in nulliparous women during the first stage of childbirth. *International*

- al Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences. 2017; 6(5):828-42.
<https://ijbpas.com/archive/archive-single-pdf/2634>
- [28] Boswell MV, Eliot Cole B, editors. Weiner's pain management: A practical guide for clinicians. 7th ed. Boca Raton: CRC Press; 2005. <https://books.google.com/books?id=E4aiDwAAQBAJ&dq>
- [29] Babashahi M, Fayazi S, Mardanian Dehkordi L. [Comparing the effect of massage and inhalation aromatherapy on anxiety level of the patients in the preoperative period (Persian)]. Nursing and Midwifery Journal. 2015; 13(4):284-91. <http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1432-en.html>
- [30] Zafarnia N, Kohan S, Abbaszadeh A, Nakhaei N, Miri S, Soleimani L. [The Effect of the therapeutic touch on preoperative anxiety in women with elective surgeries (Persian)]. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2010; 10(1):42-51. <http://jqr.kmu.ac.ir/article-1-16-en.html>
- [31] Zakerimoghadam M, Aliasgharpoor M, Mehran A, Mohammadi S. [Effect of patient education about pain control on patients' anxiety prior to abdominal surgery (Persian)]. Journal of Hayat. 2010; 15(4):13-22. <http://hayat.tums.ac.ir/article-1-101-en.html>
- [32] Kahangi LS, Moeini M, Babashahi M. [The effects of reflexology on anxiety levels before coronary artery bypass graft surgery (Persian)]. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2012; 9(5):389-96. <http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/268>
- [33] Dagli R, Avcu M, Metin M, Kiymaz S, Ciftci H. The effects of aromatherapy using rose oil (*Rosa damascena* Mill.) on preoperative anxiety: A prospective randomized clinical trial. European Journal of Integrative Medicine. 2019; 26:37-42. [DOI:10.1016/j.eujim.2019.01.006]
- [34] Fazlollahpour-Rokni F, Shorofi SA, Mousavinasab N, Ghafari R, Esmaeili R. The effect of inhalation aromatherapy with rose essential oil on the anxiety of patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2019; 34:201-7. [DOI:10.1016/j.ctcp.2018.11.014] [PMID]

This Page Intentionally Left Blank
