

Research Paper

The Effect of Periodic Exercise and Resveratrol Supplementation on the Expression of Pparg Coactivator-1 Alpha and Pyruvate Dehydrogenase Kinase Genes in Gastrocnemius Muscle of Old Rats With Type 2 Diabetes



Ali Salehi<sup>1</sup>, \*Hajar Abbaszadeh<sup>1</sup>, Parvin Farzanegi<sup>1</sup>

1. Department of Exercise Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.



**Citation** Salehi A, Abbaszadeh H, Farzanegi P. [The Effect of Periodic Exercise and Resveratrol Supplementation on the Expression of Pparg Coactivator-1 Alpha and Pyruvate Dehydrogenase Kinase Genes in Gastrocnemius Muscle of Old Rats With Type 2 Diabetes (Persian)]. Quarterly of "The Horizon of Medical Sciences". 2020; 26(1):68-81. <https://doi.org/10.32598/hms.26.1.3145.1>

**doi** <https://doi.org/10.32598/hms.26.1.3145.1>



**ABSTRACT**

**Received:** 26 May 2019

**Accepted:** 12 Oct 2019

**Available Online:** 01 Jan 2020

**Aims** Type 2 diabetes is the result of complex interactions between genetic and environmental factors that affect fat and glucose metabolism. The purpose of this study was to determine the effect of periodic exercise and resveratrol supplement on the expression levels of Pparg Coactivator 1-Alpha (PGC-1 $\alpha$ ) and Pyruvate Dehydrogenase Kinase (PDK4) genes in gastrocnemius muscle of old rats with type 2 diabetes.

**Methods & Materials** 42 male rats (mean age=40-50 weeks; mean body weight= 250-300 g) were randomly divided into 6 groups: healthy-control, diabetic-control, Diabetic+Periodic Exercise, Diabetic+Supplement, Diabetic+Periodic Exercise+Supplement and Saline. The type 2 diabetes was induced by intraperitoneal injection of Streptozotocin (50 mg/kg body weight). The exercise protocol consisted of 10 sets of 1-min activities at 50% intensity and a 2-min rest period between sets, and each week the speed was increased by 2 meters per minute. The exercises were performed for eight weeks. Resveratrol supplement was injected intraperitoneally daily at a dose of 20 mg/kg body weight. The expressions of PDK4 and PGC-1 $\alpha$  in the gastrocnemius muscle were measured by real time Polymerase Chain Reaction (PCR) method.

**Findings** highest expression level of PDK4 and PGC-1 $\alpha$  genes in gastrocnemius muscle was observed in the diabetic group received both periodic exercise and Resveratrol supplement and the lowest level was reported in the diabetic-control and saline groups.

**Conclusion** The combination of resveratrol supplementation and periodic exercise can have beneficial effects on PDK4 and PGC-1 $\alpha$  expression levels in the gastrocnemius muscle of old rats with type 2 diabetes and reduce the risks of diabetes-related complications.

**Key words:**  
Periodic exercise,  
Resveratrol, PDK4,  
PGC-1 $\alpha$ , Type II  
diabetes

**Extended Abstract**

**1. Introduction**

**D**iabetes mellitus is the most common metabolic disease [2]. In diabetic patients, metabolic flexibility is impaired. Today, in addition to various sports exercises, other non-pharmacological solutions of plant origin

have been considered for the management of diabetes [13, 14]. Wang et al. [12] found that those who did not exercise had a 2.2-fold increase in the expression of Pyruvate Dehydrogenase Kinase (PDK4) following resistance exercise and symmetric endurance exercise compared to single-mode endurance exercise. Sin et al. [19], by reviewing the anti-glycemic mechanism of Resveratrol in skeletal muscle of aged and diabetic patients, confirmed the changes in the expression of

\* Corresponding Author:

Hajar Abbaszadeh, PhD.

Address: Department of Exercise Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

Tel: +98 (911) 2163511

E-mail: h.abaszadeh61@gmail.com

PDK4 through the Pparg Coactivator-1 Alpha (PGC-1 $\alpha$ ) pathway following Resveratrol consumption. The aim of present study was to examine the effect of periodic exercise and resveratrol supplementation on the expression of PDK4 and PGC-1 $\alpha$  genes in gastrocnemius muscle of old rats with type 2 diabetes.

## 2. Methods and Materials

This is an experimental study conducted in 2018 in the research center of Islamic Azad University of Sari branch. 42 male rats (mean age=40-50 weeks; mean body weight=250-300 g) were randomly divided into 6 groups: healthy-control, diabetic-control, Diabetic+Periodic Exercise, Diabetic+Supplement, Diabetic+Periodic Exercise+Supplement, and Saline. The type 2 diabetes was induced by intraperitoneal injection of Streptozotocin (50 mg/kg body weight).

The exercise protocol consisted of 10 sets of 1-min activities at 50% intensity and a 2-min rest period between sets, and each week the speed was increased by 2 meters per minute. The exercises were performed for eight weeks. Resveratrol supplement was injected intraperitoneally daily at a dose of 20 mg/kg body weight. The expressions of PDK4 and PGC-1 $\alpha$  in the gastrocnemius muscle were measured by real time Polymerase Chain Reaction (PCR) method. After quantification, gene expression values were analyzed using 2- $\Delta\Delta Ct$  formula.

## 3. Results

According to the results shown in Figure 1, the highest expression level of PDK4 gene in gastrocnemius muscle was observed in the diabetic group received both periodic exercise and Resveratrol supplement and the lowest level was reported in the diabetic-control and saline groups. The increase in PDK4 level in the rats treated with a combination of resveratrol and periodic exercise was significantly higher than that of those received resveratrol and periodic exercise alone ( $P<0.001$ ). The results also show that the highest expression of PGC-1 $\alpha$  gene was in the diabetic group received both periodic exercise and Resveratrol supplement and its lowest levels in the diabetic-control group (Figure 2). The increase in PGC-1 $\alpha$  level in the rats treated with a combination of resveratrol and periodic exercise was significantly higher than that of those received resveratrol and periodic exercise alone ( $P<0.001$ ).

## 4. Discussion

A number of previous studies have shown that diabetes is associated with an increase in the concentration of PDK4, a decrease in its gene expression, and its poor function [9, 11, 24]. In the present study, we found that the expression of the PDK4 gene in diabetic rats increased after administration of resveratrol to the gastrocnemius muscle tissue. Similarly, previous studies have shown that resveratrol supplementation can improve the complications of muscle aging and insulin resistance [13, 19].

**Table 1.** Primer sequences used to match PDK4 and PGC-1 $\alpha$  genes

Gene	Forward Primer 5'-3'	Reverse Primer 5'-3'
GAPDH	AAGTTCAACGGCACAGTCAAGG	CATACTCAGCACAGCATCACC
PDK4	GAGTTGTGTAGGTTAGGTGG	AAATATGAAGAGGTGTTGGTGG
PGC-1 $\alpha$	CGGAAATCATATCCAACCAGAT	TGAGGACCGCTAGCAAGTTGC


GAPDH= Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase

Quarterly of  
The Horizon of Medical Sciences

**Table 2.** Kruskal-Wallis test results for PGC-1 $\alpha$  and PDK4 gene expressions in the gastrocnemius muscle


Variables	Chi-Square	df	P
PDK4 expression	37.782	7	0.001*
PGC-1 $\alpha$ expression	35.503	7	0.001*

Quarterly of  
The Horizon of Medical Sciences



**Figure 1.** Comparison of the mean PDK4 mRNA expression levels by Real time PCR method

There was no significant difference in mean PDK4 mRNA levels in groups with the same symptom ( $P>0.05$ ). The mean PDK4 mRNA expression levels in groups were as  $fc > bf > b > a$ .



**Figure 2.** Comparison of the mean PGC-1 $\alpha$  mRNA expression levels by Real time PCR method

There was no significant difference in mean PGC-1 $\alpha$  mRNA levels in groups with the same symptom ( $P>0.05$ ). The mean PGC-1 $\alpha$  mRNA expression levels in groups were as  $b1 > b2 > b3 > a1 > a2$ .

Resveratrol supplementation can also increase the transactivation of PDK4 in response to decreased protein content of PDK4 [19]. In the present study, it was also observed that mRNA expression of PDK4 was higher in the resveratrol supplementation+periodic exercise group than in diabetic and saline groups. Wang et al. showed that after exercise, mRNAs associated with PGC-1 $\alpha$  and PDK4 increased 5-8 times in both types of muscle fibers [12].

In the present study, changes in PGC-1 $\alpha$  gene expression were consistent with the results of PDK4 gene. We suggest that a combination of resveratrol and periodic exercise be further studied as an effective way to

improve glucose uptake in gastrocnemius muscles of older rats with type 2 diabetes.

## 5. Conclusion

The combination of resveratrol supplementation and periodic exercise can have beneficial effects on PDK4 and PGC-1 $\alpha$  expression levels in the gastrocnemius muscle of old rats with type 2 diabetes and reduce the risks of diabetes-related complications.

## Ethical Considerations

### Compliance with ethical guidelines

This study was approved by the Animal Care and Use Committee of Islamic Azad University of Sari branch (Ethical Code: IR.IAU.SARI.REC.1397.011). All ethical principles governing animal experiments were fully met.

### Funding

The present paper was extracted from the PhD dissertation of the first author, Department of Exercise Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari.

### Authors' contributions

Conceptualization, investigation, writing – review & editing, supervision: All Authors; Methodology, writing – original draft, resources: Ali Salehi, Hajar Abbaszadeh; Funding acquisition: Ali Salehi.

### Conflicts of interest

The authors declared no conflict of interest.

### Acknowledgements

The authors would like to thank the animal laboratory staff of Islamic Azad University of Sari branch for their valuable cooperation.

---

This Page Intentionally Left Blank

---

## اثر تمرین تنابی و رزوراترول بر بیان ژن‌های PGC-1 $\alpha$ و PDK4 در عضله دوقلوی موش‌های مسن مبتلا به دیابت نوع ۲

علی صالحی<sup>۱</sup>، هاجر عباس‌زاده<sup>۱</sup>، پروین فرزانگی<sup>۱</sup>

۱. گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

### چکیده

**اهداف** دیابت نوع ۲ نتیجه کنش‌های پیچیده بین شاخص‌های زنتیکی و محیطی عمل کننده روی متابولیسم چربی و گلوكز است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین تنابی و رزوراترول بر بیان ژن PGC-1 $\alpha$  و PDK4 در عضله دوقلوی موش‌های مسن مبتلا به دیابت نوع ۲ بود.

**مواد و روش‌ها** ۴۲ سر موش نر (میانگین سنی ۴۰ تا ۵۰ هفته و میانگین وزنی ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم) به شن گروه؛ کنترل - سالم، کنترل - دیابتی، دیابتی + تمرین تنابی، دیابتی + مکمل، دیابتی + تمرین / تنابی + مکمل و سالین تقسیم شدند. نحوه دیابت کردن موش‌های تزریق درون صفاقی استریتووزوتونین با تردد ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بود. تمرین شامل ۱۰ ست فعالیت یکدقيقه‌ای با شدت ۵ درصد و دو دقیقه استراحت بین ستها بود و هر هفتة دو متر در دقیقه به سرعت افزوده می‌شد. تمرینات به مدت هشت هفتة انجام شد. رزوراترول روزانه با تردد ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت درون صفاقی به موش‌ها تزریق شد. بیان ژن PGC-1 $\alpha$  و PDK4 در بافت عضله دوقلو به روش Real time PCR آندازه‌گیری شد.

**یافته‌ها** نتایج نشان می‌دهد که بیشترین بیان ژن PGC-1 $\alpha$  و PDK4 در عضله دوقلو در گروه مکمل + تمرین تنابی و کمترین سطوح آن در گروه کنترل - دیابتی و سالین وجود دارد.

**نتیجه‌گیری** نتایج نشان داد که ترکیبی از رزوراترول و تمرین تنابی می‌تواند اثرات مفیدی بر بیان ژن PGC-1 $\alpha$  و PDK4 در عضله دوقلوی موش‌های مسن مبتلا به دیابت نوع ۲ داشته و در نتیجه خطرات ناشی از عوارض دیابت را کاهش دهد.

تاریخ دریافت: ۵ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ پذیرش: ۲۰ مهر ۱۳۹۸

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸

### کلیدواژه‌ها:

تمرین تنابی،

رزوراترول،

PDK4،

PGC-1 $\alpha$ ،

دیابت

نوع دو

### مقدمه

در کنترل مصرف سوبسترا در گیر است و باعث تغییر اکسیداسیون سوبسترا از کربوهیدرات‌ها به سمت چربی‌ها می‌شود [۵، ۴].

PDK4 بهوفور در جزایر پانکراس، قلب و عضله اسکلتی یافت می‌شود؛ چراکه این بافت‌ها مصرف گلوكز بالا و نرخ اکسیداسیون اسید چرب بالایی دارند [۶]. فراهم‌بودن PDK4 به طور ویژه در عضله و کبد برای پاسخ به ناشتاپی و فعالیت ورزشی مهم است. از طرفی، مطالعات اخیر نشان دادند که فعال‌سازی PPAR $\alpha$  یک هدف شناخته شده برای PGC-1 $\alpha$ ، موجب بیان PDK4 می‌شود. به طور قابل توجهی، PGC-1 $\alpha$  توسط ناشتاپی و فعالیت ورزشی فعال می‌شود. PGC-1 $\alpha$  یک مولکول متصل (سواچ) است که چندین عامل کلیدی در برنامه‌های سازگار با

اگرچه پیری یک بیماری نیست، ولی عامل خطر برای اکثر بیماری‌های مزمن در نظر گرفته می‌شود [۱]. تغییرات مرتبط با سن و بی‌تحرکی و تغییرات در ترکیب بدنی، عوامل ایجاد بیماری‌های متابولیکی هستند. بیماری دیابت شیرین شایع‌ترین بیماری متابولیکی است [۲]. این بیماری یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان است که حدود یک تا دو درصد افراد جامعه بدان مبتلا هستند و سبب ازکارافتادگی و مرگ‌ومیر فراوان می‌شود [۱، ۳] در افراد دیابتی، انعطاف‌پذیری متابولیکی<sup>۱</sup> دچار اختلال می‌شود. انعطاف‌پذیری متابولیکی، ظرفیت یک سیستم برای تنظیم اکسیداسیون منابع انرژی (عمدتاً گلوكز و اسیدهای چرب) بر اساس میزان دسترسی به این مواد ساختی است. PDK4<sup>۲</sup> آنزیمی است که

1. Metabolic Flexibility

2. Pyruvate dehydrogenase kinase 4 (PDK4)

\* نویسنده مسئول:

دکتر هاجر عباس‌زاده

نشانی: ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه فیزیولوژی ورزشی.

تلفن: ۰۹۱۱ (۰۱۱) ۲۱۶۳۵۱۱

پست الکترونیکی: h.abaszade61@gmail.com

از جمله این مواد رزوراترول<sup>۸</sup> است که در گیاهان بنتف و قرمزنگ به خصوص در پوست انگور قرمز و خانواده توت‌ها وجود دارد [۱۵]. رزوراترول یک ترکیب پلی‌فنول است و در پاسخ به حمله پاتوژن‌ها واسترس محیطی در گیاهان تولید می‌شود [۱۶، ۱۷]. این ماده یک فیتوالکسین طبیعی است که حداقل در ۲۷ گونه گیاهی یافته می‌شود. تحقیقات نشان داده‌اند که رزوراترول دارای اثرات ضدالتاہی، آنتی‌اکسیدانی و ضددیابتی است [۱۸]. سین و همکاران با مروری بر مکانیسم آنتی‌گلیسیمی رزوراترول در عضلات اسکلتی افراد مسن و بیماران دیابتی، تغییرات بیان PDK4 از مسیر PGC-1α را تحت مصرف رزوراترول تأیید کردند [۱۹]. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده، محقق به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا تمرین تناوبی به همراه مکمل رزوراترول بر بیان ژن PDK4 و PGC-1α بافت عضله دوقلو در موش‌های دیابتی تاثیری دارد؟

### مواد و روش‌ها

با توجه به کنترل بیشتری که روی آزمودنی‌های حیوانی صورت می‌گیرد، پژوهش از نوع تجربی است. آزمودنی‌ها در طی مراحل پژوهش در قفس‌های پلی‌کربنات شفاف به ابعاد  $15 \times 15 \times 30$  سانتی‌متر ساخت شرکت رازی راد، با دمای محیط  $2 \pm 20$  درجه سانتی‌گراد و رطوبت  $5 \pm 50$  درصد به همراه تهویه مناسب و چرخه روشانی و قاریکی ۱۲:۱۲ نگهداری شدند. غذای مورد نیاز آن‌ها که از شرکت خوارک دام به پرور کرج به صورت پلت تهیه شد و آب موره نیاز آن‌ها به صورت آزاد در بطری ۵۰۰ میلی‌لیتری ویژه حیوانات آزمایشگاهی در اختیار آنان قرار گرفت. جامعه آماری شامل ۴۲ سر موش صحرایی نر مسن (با میانگین سنی ۴۰ تا ۵۰ هفت‌ماهی) بود که تکثیر آن‌ها در مرکز پژوهش دانشگاه آزاد واحد ساری انجام شد. میانگین وزنی آن‌ها ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم بود به طور تصادفی به شش گروه تقسیم شدند که شامل گروه‌های کنترل - سالم، کنترل - دیابتی، دیابتی + تمرین تناوبی، دیابتی + مکمل، دیابتی + تمرین / تناوبی + مکمل و سالین (تزریق محلول سالین برای کنترل اثر تزریق) بودند.

قبل از شروع پروتکل اصلی، آزمودنی‌های قرار گرفته در گروه تمرین و گروه مکمل + تمرین به منظور آشنایی با چگونگی فعالیت توسط ترمیمیل، در یک هفته طی پنج جلسه، به مدت پنج دقیقه با سرعت  $10-8$  متر بر دقیقه با شیب صفر فعالیت داشتند. پروتکل تمرین تناوبی شامل ۱۰ سمت یک‌دقیقه‌ای با شدت ۵۰ درصد و دو دقیقه استراحت بین سمت‌ها بود و با سرعت ۱۴ متر در دقیقه شروع و هر هفته دو متر در دقیقه به سرعت افزوده می‌شد. تمرینات هفت‌های سه جلسه و به مدت هشت هفته انجام شد [۲۰]. نحوه دیابتی‌کردن موش‌ها به این صورت بود که به دلیل

ترموژنیک در چربی قهقهه‌ای را به راه می‌اندازد، شامل تحریک مصرف سوخت، اکسیداسیون میتوکندریایی اسید چرب و تولید گرمای از طریق بیان پروتئین جفت نشده (UCP-1). همزمان با فعال‌سازی بیان UCP-1، بیان PGC-1α برای پیشروی تمایز به سمت دومان چربی قهقهه‌ای کافی است.

PGC-1α اغلب به یک لیگاند پروتئینی برای ERRها<sup>۹</sup> برمی‌گردد. شواهد اخیر نشان می‌دهند که ERRها با PGC-1α برای تنظیم بیان ژن میتوکندریایی شریک هستند و این گیرنده‌های هسته‌ای به عنوان واسطه‌های مهم در عملکرد و متabolism میتوکندریایی دخالت می‌کنند. کشف PGC-1α نقطه عطفی در فهم اساس مولکولی سازگاری‌های ناشی از فعالیت ورزشی در بیوژن و عملکرد میتوکندریایی و تنظیم متabolism سوبسترای عضله اسکلتی را نشان می‌دهد [۸].

نسخه‌برداری از ژن‌های صرف‌جو مانند PDK4 در اواخر تمرین با فشار کم و طولانی‌مدت افزایش می‌یابد. عمل این ژن کاهش پایدار در اکسیداسیون کربوهیدرات حین این گونه تمرینات است و باعث کاهش در میزان استفاده از گلوکز و گلیکوز می‌شود [۹، ۱۰]. در گذشته این موضوع آشکار بود که ورزش باعث بهبود جذب گلوکز در عضله اسکلتی بیماران دیابتی می‌شود. به دنبال فعالیت، پروتئین‌هایی مانند آدنوزین مونوفسفات کیناز ایجاد می‌شود تا بتوانند جذب گلوکز را افزایش دهند [۹-۱۱].

از طرفی دیگر، بیان PDK4 در عضله اسکلتی در پاسخ به همه پروتکل‌های تمرینی افزایش می‌یابد، اما این افزایش در تمرینات استقاماتی در مقایسه با تمرینات تک جلسه‌ای بیشتر است. برای مثال، وانگ و همکاران دریافتند که در افراد تمرین‌نکرده پاسخ  $2/2$  برابری در بیان PDK4 متعاقب تمرینات مقاومتی و تمرین استقاماتی متقاضان<sup>۱۰</sup> نسبت به تمرین استقاماتی تک جلسه‌ای بروز می‌یابد [۱۲].

امروزه برای مدیریت بیماری دیابت، علاوه بر انجام تمرینات مختلف ورزشی، راهکارهای غیردارویی دیگری نیز با منشأ گیاهی مورد توجه قرار گرفته است [۱۳، ۱۴]. مواد بیولوژیک با منشأ گیاهی شاخه‌ای از فارماکوتراپی مدرن بیماری‌ها را تشکیل می‌دهند. اگرچه عوامل دارویی متنوعی برای درمان انواع بیماری‌ها وجود دارد، اما اغلب بیماران قادر به تحمل اثرات جانبی داروهای شیمیایی نیستند و از سوی دیگر اکثر گیاهان اثرات جانبی بسیار اندکی بر روی بیماران به جای می‌گذارند. بنابراین در سال‌های اخیر، ترکیب استفاده از داروهای گیاهی در کنار پرداختن به فعالیت بدنی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

5. Uncoupling protein-1

6. Estrogen-related receptor alpha

7. Concurrent endurance

جدول ۱. مشخصات پرایمرهای مورداستفاده جهت همسانسازی ژن‌های PDK4 و PGC-1α

Reverse primer ۵'-۳'	Forward primer ۵'-۳'	ژن
CATACTCAGCACCAAGCATCACC	AAGTTCAACGGCACAGTCAAGG	GAPDH
AAATATGAAGAGGTGTTGGTGG	GAGTTGTGTAGGTTAGGTGG	PDK4
TGAGGACCGCTAGCAAGTTGC	CGGAAATCATATCCAACCAGAT	PGC-1α

## افق دانش

نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار نمایش داده شدند. بررسی طبیعی بودن داده‌ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک و بررسی تجانس واریانس‌ها از آزمون لوین انجام شد. با توجه به طبیعی نبودن توزیع داده‌ها، جهت بررسی تغییرات بین گروه‌ها از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. سطح معناداری در نظر گرفته شده  $P < 0.05$  بود و از نسخه ۲۳ نرم افزار SPSS استفاده شد.

## یافته‌ها

نتایج آزمون کروسکال والیس برای بیان ژن PDK4 عضله دوقلو در گروه‌های مختلف، در **جدول شماره ۲** نشان داده شده است. ارزش کای اسکوئر محاسبه شده  $27/78/2$  ( $3^2/3^3$ ) و معنادار بودن آن در سطح  $P < 0.001$ ، بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار بیان ژن PDK4 عضله دوقلو در بین گروه‌های مختلف پژوهش است. بیشترین بیان ژن PDK4 عضله دوقلو در گروه تنابی + دیابت + رزوراترول و کمترین سطوح آن در گروه کنترل - دیابتی مشاهده شد (**تصویر شماره ۱**).

میانگین بیان ژن PDK4 عضله دوقلو در موش‌های مسن مبتلا به دیابت نوع ۲ کاهش معنی‌داری در گروه‌های کنترل - دیابت در مقایسه با سایر گروه‌ها داشته است. در اینجا تفاوت معنی‌داری در بیان ژن PDK4 بین گروه‌های رزوراترول و کنترل - سالم نبود (**تصویر شماره ۱** با علامت‌های مشابه،  $P > 0.05$ ). اختلاف معنی‌داری میان گروه‌های کنترل - دیابت و تنابی نیز مشاهده نشد. در حالی که ترکیب رزوراترول + تمرين تنابی موجب یک افزایش معنی‌داری در بیان ژن PDK4 در مقایسه با گروه‌های دیگر شد ( $P < 0.01$ ). بیان ژن PDK4 در گروه‌های رزوراترول و تمرين تنابی بیشتر از گروه کنترل - دیابت بود ( $P < 0.01$ ). افزایش سطوح PDK4 در موش‌های تحت درمان با ترکیبی از رزوراترول و تمرين تنابی به طور معنی‌داری بیشتر از رزوراترول و تمرين تنها بود ( $P < 0.001$ ). همچنین این تفاوت بین گروه کنترل با گروه رزوراترول معنی‌دار بوده است (**تصویر شماره ۱**).

همچنین، نتایج آزمون کروسکال والیس برای بیان ژن PGC-1α عضله دوقلو در گروه‌های مختلف در **جدول شماره ۲** نشان داده شده است. ارزش کای اسکوئر محاسبه شده ( $35/50/3$ ) و معنادار بودن آن در سطح  $P < 0.001$

مسن بودن موش‌های داروی استرپتوزوتوسین<sup>۱</sup> با  $50 \mu\text{g}/\text{ml}$  گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت درون‌صفاقی به آنان تزریق شد و با بررسی نمونه خون از گوشش چشم و گلوکز ناشتایی بیش از  $250 \mu\text{g}/\text{ml}$  گرم بر دسی لیتر از دیابتی بودن مطمئن شدیم [۲۱، ۲۲]. مکمل رزوراترول در گروه‌های مکمل و مکمل + تمرين، روزانه با  $20 \mu\text{g}/\text{ml}$  گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت درون‌صفاقی به آنان تزریق می‌شد [۱۸، ۲۱، ۲۲].

۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرينی و پس از ۱۰ تا ۱۲ ساعت ناشتایی، آزمودنی‌ها با تزریق درون‌صفاقی ترکیبی از کتابخانه و زایلزین بیهودشند و نمونه‌گیری‌های بافتی صورت گرفت. بافت عضله دوقلوی آن‌ها جدا و در محیط منفی  $40^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد نگهداری و سپس به آزمایشگاه ارسال شد. مطالعات بیان ژن PDK4 و PGC-1α در بافت عضله دوقلو به روش Real time PCR<sup>۱</sup> سنجهش و پس از کتی‌سازی، مقادیر بیان ژن با استفاده از فرمول  $\Delta\Delta Ct$ -۲ تجزیه و تحلیل شد.

در ابتدا، نمونه‌های عضلانی در بافر فسفات (pH 7/0) در دمای چهار درجه سانتی‌گراد با هموژنیزه کننده همگن شدند. کل RNAها از بافت عضله دوقلو از تمام موش‌ها با استفاده از کیت SinaClon RN7713(RNase-Plus) استخراج شدند. برای تخمین کمیت و کیفیت RNAهای استخراج شده از روش اسپکتروفوتومتر (Thermo Sci., Newington NH) ND-1000 Nanodrop استفاده شد. ساخت cDNA با استفاده از کیت سنتر Thermo science آلمان طبق دستورالعمل شرکت سازنده در دمای  $42^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد به مدت یک ساعت انجام شد. بیان ژن‌های مورد نظر با روش PCR Real-Time و Amplicon Real Q-PCR 29 Master Mix Kit با دستگاه ۴۰ سیکل انجام شد. سطوح mRNAها نسبت به دانمارک در  $40^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد بودند. در **جدول شماره ۱** توالی مقدار mRNA GAPDH نرمال شدند. در **جدول شماره ۱** توالی پرایمرهای مورداستفاده آورده شده است.

جهت طبقه‌بندی داده‌ها، از آمار توصیفی استفاده شد و


9. Streptozocin (STZ)

10. Real time polymerase chain reaction

جدول ۲. نتایج آزمون کروسکال والیس برای میزان بیان ژن  $PDK4$  و  $PGC-1\alpha$  عضله دوقلو

P	df	Chi-Square	آماره
.0001*	۷	۳۷/۷۸۲	بیان ژن $PDK4$ عضله دوقلو
.0001*	۷	۳۵/۵۰۳	بیان ژن $PGC-1\alpha$ عضله دوقلو

افق دانش




افق دانش

تصویر ۱. مقایسه سطوح میانگین mRNA برای بیان ژن  $PDK4$  در عضله دوقلو که به وسیله Real time PCR مشخص شد. تفاوت معنی‌داری در سطوح میانگین mRNA برای بیان ژن  $PDK4$  در گروه‌های با علامت مشابه وجود نداشت. سطوح میانگین mRNA برای بیان ژن  $PDK4$  در گروه‌ها به ترتیب  $fc > bf > b > a$  بود. سطح معنی‌داری  $P < 0.05$  در نظر گرفته شد.

رزوراترول + تمرین تنابی و کنترل - سالم نبود (تصویر شماره ۲) با علامت مشابه (b) ( $P > 0.05$ ).

اختلاف معنی‌داری میان گروه‌های کنترل-دیابت و تنابی نیز مشاهده نشد (تصویر شماره ۲) با علامت مشابه (a) ( $P > 0.05$ ). در حالی که گروه‌های رزوراترول و رزوراترول + تمرین تنابی موجب یک افزایش معنی‌دار در بیان ژن  $PGC-1\alpha$  در مقایسه با گروه‌های دیگر شدند ( $P < 0.01$ ). افزایش بیان ژن  $PGC-1\alpha$  در میانگین بیان ژن  $PGC-1\alpha$  بین گروه‌های رزوراترول و تمرین تنابی موش‌های تحت درمان با ترکیبی از رزوراترول و تمرین تنابی

بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار بیان ژن  $PGC-1\alpha$  عضله دوقلو در بین گروه‌های مختلف پژوهش بود. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین بیان ژن  $PGC-1\alpha$  عضله دوقلو در گروه مکمل + تمرین تنابی و کمترین سطوح آن در گروه کنترل - دیابت است. میانگین بیان ژن  $PGC-1\alpha$  عضله دوقلو در موش‌های مسن مبتلا به دیابت نوع ۲ کاهش معنی‌داری در گروه کنترل - دیابت در مقایسه با سایر گروه‌ها داشته است. در اینجا تفاوت معنی‌داری در بیان ژن  $PGC-1\alpha$  بین گروه‌های رزوراترول،



افق دانش

تصویر ۲. مقایسه سطوح میانگین mRNA برای بیان ژن  $PGC-1\alpha$  در عضله دوقلو که به وسیله Real time PCR مشخص شد. تفاوت معنی‌داری در سطوح میانگین mRNA برای بیان ژن  $PGC-1\alpha$  در گروه‌های با علامت مشابه وجود نداشت. سطوح میانگین mRNA برای بیان ژن  $PGC-1\alpha$  گروه‌ها به ترتیب  $a1 > b2 > b3 > a2$  بود. سطح معنی‌داری  $P < 0.05$  در نظر گرفته شد.

پلی‌فنول طبیعی در انگور قرمز، پروتئین سیرتوئین<sup>۱۴</sup> مرتقب با طول عمر را فعال می‌کند و علاوه بر تأثیرات مستمر آن در فرایندهای انرژی‌زایی میتوکندری، حساسیت انسولین را افزایش می‌دهد [۱۶]. چنین مزایایی می‌تواند به دلیل توانایی رزوراترول برای تحریک مسیرهای متابولیسم داخل سلولی باشد که باعث می‌شود سلول‌ها مؤثرتر از انسولین و گلوکز استفاده کنند و درنهایت منجر به کاهش سطح قند خون می‌شود [۱۷].

مطالعات قبلی گزارش کردند که مکمل رزوراترول می‌تواند موجب افزایش فعالیت نسخه‌برداری PDK4 عضله دوقلو در پاسخ به کاهش محتوای پروتئینی PDK4 شود [۱۹]. در مطالعه حاضر، ملاحظه شد که بیان mRNA از PDK4، در گروه‌های رزوراترول و تمرین تناوبی بالاتر از گروه‌های بیمار و سالین بود. مهم‌تر از همه، افزایش سطح mRNA مربوط به PDK4 در موش‌های درمان‌شده با ترکیبی از رزوراترول و تمرین به طور معنی‌داری بالاتر از موش‌هایی بود که فقط رزوراترول و یا تمرین داشتند.

چندین مطالعه اثرات مثبت رزوراترول را در ترکیب با تمرینات متفاوت بر تنظیم متابولیسم گلوکز عضله در افراد مسن دیابتی نوع ۲ ارزیابی کردند [۲۰]. اخیراً یک مطالعه نشان داد که تمرین، رزوراترول و ترکیب این دو با افزایش بیان p-AMPK و SIRT1 اثرات حفاظتی بر روی سارکوپینی، به عنوان سندروم مرتبط با سن دارند [۲۱]. اثرات تنظیم‌کننده‌ی SIRT1 بر روی هومئوستاز انرژی در عضلات اسکلتی ممکن است نیاز به یک سیگنال فعل در مسیرهای بالایی داشته باشد که از طریق سنسور انرژی AMPK در پاسخ به تحریک رزوراترول تنظیم می‌شود [۱۹]. همچنین افزایش نیازهای انرژی مربوط به تمرین منجر به القای بیان زن PGC-1α عضلانی می‌شود که به نوبه خود موجب بیان زن ERRα می‌شود. ERRα سپس به پرموتر زن PDK4 متصل می‌شود، جایی که طور مستقیم با ERRα برای ایجاد بیان زن PDK4 همکاری می‌کند [۱۹].

وانگ و همکاران نشان دادند که بعد از تمرین، mRNA به PGC-1α و PDK4 در هر دو نوع تار، پنج تا هشت برابر افزایش می‌یابد [۱۷]. در تحقیق حاضر نیز تغییرات بیان زن PGC-1α همسو با نتایج زن PDK4 بود. تفاوت معنی‌داری در میزان بیان نسبی زن PGC-1α عضله دوقلو بین گروه‌های مختلف مشاهده شد ( $P<0.000$ ). نتایج نشان می‌دهد بیشترین بیان زن PGC-1α عضله نعلی و دوقلو در گروه رزوراترول + تمرین تناوبی و کمترین سطوح آن در گروه بیمار و سالین مشاهده شد. برخی تحقیقات نتایجی مخالف تحقیق حاضر را نشان دادند.

گزارش شده که تمرین با شدت بالا، موجب افزایش فراوانی mRNA PGC-1 شده است و این امر با افزایش سیگنالینگ AMPK و بدون تفاوت

به طور معنی‌داری بیشتر از رزوراترول و تمرین تنها بود (تصویر شماره ۲،  $P<0.001$ ).

## بحث

در این پژوهش، اثرات مثبت مکمل رزوراترول، تمرین تناوبی و ترکیب آن‌ها بر بیان زن PDK4 و PDC-1α در عضله دوقلوی موسهای مسن مبتلا به دیابت نوع ۲ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیان زن PDK4 در عضله دوقلوی موسهای مسن مبتلا به دیابت نوع کاهش می‌یابد. احتمالاً، کاهش بیان زن PDK4 به علت افزایش سطح پروتئین آن در افراد دیابتی است [۲۲]. تعدادی از مطالعات قبلی نشان دادند که دیابت همراه با افزایش غلظت PDK4، کاهش بیان زن آن و عملکرد نامناسب زن PDK4 است [۹، ۱۱، ۲۴]. PDK4‌ها توسط هرمون‌های انسولین، گلوکوکورتیکوئیدها، تیروئید و اسیدهای چرب تنظیم می‌شوند. شواهد جدیدی وجود دارد که در چندین اختلال متابولیکی، مانند دیابت، PDK4 فعالیت کمپلکس پیروات دهیدروزناز<sup>۱۵</sup> را کاهش می‌دهد [۹، ۱۱].

با توجه به فعالیت تنظیم‌شده PDHα<sup>۱۶</sup> توسط انسولین، گزارش شده است که انسولین فعالیت PDP<sup>۱۷</sup> را افزایش می‌دهد و پروتئین PDK4 موجود در عضلات اسکلتی موسهای را کاهش می‌دهد [۲۵]. با توجه به این مشاهدات، دیده شده که دیابت نوع ۲ منجر به اختلال در تنظیم کاهنده انسولین در PDK4 عضله اسکلتی می‌شود که مهار PDH ناشی از PDK4 و مهار اکسیداسیون گلوکز را که ممکن است به مقاومت انسولینی منجر شود، نشان می‌دهد [۲۵].

پیشنهاد شده که تأثیر فعالیت نسخه‌برداری PDK4 در دیابت احتمالاً یک استراتژی درمانی بالقوه است [۴، ۲۵] با توجه به نقش حیاتی این زن در پاتوزن دیابت، متابولیسم گلوکز و لیپید و مقاومت به انسولین، این زن می‌تواند هدفی برای داروهای مختلف در محافظت از متابولیسم گلوکز عضلانی باشد.

در اینجا اثرات رزوراترول، تمرین تناوبی و ترکیب آن‌ها برای افزایش بیان زن PDK4 در موسهای دیابتی نوع ۲ مقایسه شد. در مطالعه حاضر، دریافتیم که بیان زن PDK4 در موسهای دیابتی پس از تجویز رزوراترول در بافت عضله دوقلو افزایش می‌یابد. به همین ترتیب، مطالعات قبلی نشان دادند که مکمل رزوراترول می‌تواند پیامدهای پیری عضلانی و مقاومت به انسولین را بهبود بخشد [۱۳، ۱۹].

شواهد جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که رزوراترول، یک

11. Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDC)

12. Pyruvate dehydrogenase

13. Pyruvate dehydrogenase phosphatase

PDK توسط مهارکننده‌های pan-PDK منجر به فعالسازی PDK می‌شود که انتخابگر تبدیل گلوکز به لاکتات هستند [۳۱].

به خوبی تأیید شده است که رزوراترول موجب افزایش انتقال / مصرف گلوکز در عضله اسکلتی می‌شود [۳۲]. نشان داده شده که عضله اسکلتی بیماران دیابتی افزایش پاسخ GLUT4 و SIRT1 را در پاسخ به مکمل روزانه ۱۲ هفته‌ای با رزوراترول را نشان می‌دهد [۳۳]. همچنین گزارش شده است که مکمل ۱۶ ماهه رزوراترول باعث افزایش جذب گلوکز در عضله‌های تحریک شده با انسولین می‌شود [۳۴]. به هر حال، معلوم شده است که فعال شدن SIRT1 توسط رزوراترول ممکن است بیان موضعی غشایی GLUT4 را افزایش دهد و در نتیجه بهبود جذب گلوکز در عضله پیر را افزایش دهد. رزوراترول، یک پلی‌فنول طبیعی در انگور قرمز است که دارای اثرات ضدھیبرگلیسمی شامل تحریک جذب گلوکز و پیشگیری از تغییرات نامطلوب در سیگنالینگ انسولین در عضله اسکلتی می‌شود [۱۹].

بنابراین، یافته‌های ما نشان دادند که درمان ترکیبی با مکمل رزوراترول و تمرین تنابوی می‌تواند برای بهبود بیان PDK4 و mRNA PGC-1α و نیز متابولیسم سلول‌های عضلاتی آزمودنی‌های مسن مناسب‌تر باشد. گرچه رزوراترول دارای خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی است، ترکیب آن با تمرین تنابوی می‌تواند برای کاهش اختلالات ناشی از دیابت نوع ۲ مؤثرتر باشد. با این حال، تعداد کم موشها در زیرگروه‌های پژوهش محدودیت مطالعه‌ما بود.

### نتیجه‌گیری

به طور کلی، نتایج ما نشان داد که ترکیبی از رزوراترول و PGC-1α در عضله دوقلوی موش‌های مسن مبتلا به دیابت نوع ۲ داشته و در نتیجه خطرات ناشی از عوارض دیابت را کاهش دهد.

### ملاحظات اخلاقی

#### پیروی از اصول اخلاق پژوهش

این پژوهش توسط کمیته مراقبت از حیوانات و استفاده از آن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تأیید شده است (شماره مجوز تصویب: R.IAU.SARI.REC.1397.8).

#### حامي مالي

این مقاله مستخرج از رساله دکتری آقای علی صالحی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، دانشکده علوم انسانی با کد ۲۰۸۲۱۴۰۴۹۷۱۰۰۷ است و با هزینه شخصی انجام شده است.

در فعالیت P38 MAPK همراه بوده است [۲۷].

تحقیق دیگری نیز نشان داد رونویسی نشانگرهای بالادستی بیوژن میتوکندریایی (PGC-1α، PPAR) پس از یک جلسه تمرینی کامل در افراد بسیار تمرین‌کرده بدون تفاوت بین نوع تمرین (سرعتی یا تنابوی) افزایش می‌یابد. جالب توجه است که mRNA مربوط به یک هدف پایین‌دست (Tfam) PGC-1α تنها پس از تمرین سرعتی افزایش یافت. رونویسی ژن در طی تمرین سرعتی وابسته به کار انجام شده است که احتمالاً مربوط به ضرورت فعال شدن سریع تارهای نوع ۲ است [۱۰].

وانگ و همکاران در بررسی اثر تمرین تداومی و متناوب بر روی PDK4 mRNA در تارهای نوع ۱ و ۲ عضلات اسکلتی انسان به این نتایج رسیدند که بیان ژن‌های نشانگر متابولیسم اکسیداتیو در بین انواع تارها در زمان استراحت متفاوت نبود و بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های نوع تار و طریقه تمرین، میزان mRNA مربوط به PGC-1α و PDK4 در هر دو نوع تار ۱ و ۲ عضلاتی بعد از تمرین شدید طولانی متناوب افزایش یافت. فعالسازی ژن ناشی از تمرین (افزایش برابر) با سطح پایه mRNA همبستگی معکوس داشت. نتایج مطالعه آن‌ها نشان داد که تمرین طولانی (۹۰ دقیقه) بالای ۶۰ درصد حداقل اکسیژن مصرفی ( $V_{O_2 \text{max}}$ )، برای فعال کردن سیگنال زیستی میتوکندریایی (PGC-1α mRNA) و ظرفیت اکسیداسیون چربی (mRNA PDK4) در هر دو نوع تار کافی است.

افراد مورد مطالعه در مطالعه آن‌ها افراد بی‌تحرک بودند و نتایج ممکن است برای افراد آموزش‌دیده استقامتی معتبر نباشد [۵]. این در حالی که تمرین مداوم با ۷۰ درصد حداقل اکسیژن مصرفی تنها تغییرات جزئی در mRNA PGC-1α را ایجاد کرد [۲۸]. القای ژن بعد از تمرینات مداوم و متناوب هم در مقدار و هم در پاسخ خاص به نوع فیبر شبیه هم بود. در جریان پروتکل تنابوی، تنش متابولیکی کم و مشابه آن در طی تمرین تداومی است. دوره‌های طولانی تمرین با شدت زیاد با اختلال متابولیسم بیشتر، ممکن است یک پروتکل کارآمد در تحریک بیوژن میتوکندری نسبت به پروتکل تنابوی باشد [۵].

درک تنظیم PDK4 مهم است؛ زیرا این فرصت را برای مداخله در درمان دیابت نوع ۲ را که در حال حاضر ۶ درصد از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار خود قرار داده و طبق گزارشات با سرعت پیشرفت می‌کند، فراهم می‌کند. در حال حاضر تنظیم PDK4 در درجه اول، در سطح بیان ژن و تعامل پروتئین PDK با عوامل آلوستریک مطالعه شده است. مطالعات نشان داده است که فعالیت PDK4 نیز با تعامل سوبستراتی پروتئینی کمپلکس پیروات دهیدروژناز (PDC) تنظیم می‌شود [۲۹]. این امر، همراه با این واقعیت است که ارتباط متقابل پروتئین - پروتئین نقش مهمی در تنظیم فعالیت‌های پروتئین هدف و همواستاز سلولی را ایفا می‌کند [۳۰]. روجه و هیروماسا نشان دادند که مهار فعالیت

## مشارکت نویسنده‌گان

اجرای پروتکل: علی صالحی و هاجر عباسزاده؛ بازبینی نهایی مقاله: همه نویسنده‌گان؛ ایده اصلی: علی صالحی؛ آنالیز داده‌ها: هاجر عباسزاده؛ اجرای مطالعه و تدوین دستنوشته: پروین فرزانگی.

## تعارض منافع

بنابر اظهار نویسنده‌گان این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی ندارد.

## تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله نویسنده‌گان مقاله، از مسئولان آزمایشگاه حیوانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به دلیل همکاری‌هایشان سپاسگزاری می‌کنند.

## References

- [1] Gray DWR, Titus N, Badet L. Islet cell transplantation for insulin-dependent diabetes mellitus: Perspectives from the present and prospects for the future. *Expert Reviews in Molecular Medicine*. 2000; 2(6):1-28. [DOI:10.1017/S1462399400001861] [PMID]
- [2] Biensø RS, Olesen J, Gliemann L, Schmidt JF, Matzen MS, Wojtaszewski JF, et al. Effects of exercise training on regulation of skeletal muscle glucose metabolism in elderly men. *Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences*. 2015; 70(7):866-72. [DOI:10.1093/gerona/glv012] [PMID]
- [3] Traub O, Van Bibber R. Role of nitric oxide in insulin-dependent diabetes mellitus-related vascular complications. *Western Journal of Medicine*. 1995; 162(5):439-45. [PMID] [PMCID]
- [4] Jeoung NH. Pyruvate dehydrogenase kinases: Therapeutic targets for diabetes and cancers. *Diabetes & Metabolism Journal*. 2015; 39(3):188-97. [DOI:10.4093/dmj.2015.39.3.188] [PMID] [PMCID]
- [5] Wang L, Sahlin K. The effect of continuous and interval exercise on PGC-1 $\alpha$  and PDK4 mRNA in type I and type II fibres of human skeletal muscle. *Acta Physiologica*. 2012; 204(4):525-32. [DOI:10.1111/j.1748-1716.2011.02354.x] [PMID]
- [6] Bowker-Kinley MM, Davis WI, Wu P, Harris RA, Popov KM. Evidence for existence of tissue-specific regulation of the mammalian pyruvate dehydrogenase complex. *Biochemical Journal*. 1998; 329(Pt 1):191-6. [DOI:10.1042/bj3290191] [PMID] [PMCID]
- [7] Zhang Sh, Hulver MW, McMillan RP, Cline MA, Gilbert ER. The pivotal role of pyruvate dehydrogenase kinases in metabolic flexibility. *Nutrition & Metabolism*. 2014; 11:10. [DOI:10.1186/1743-7075-11-10] [PMID] [PMCID]
- [8] Puigserver P, Spiegelman BM. Peroxisome proliferator-activated receptor- $\gamma$  coactivator 1 $\alpha$  (PGC-1 $\alpha$ ): Transcriptional coactivator and metabolic regulator. *Endocrine Reviews*. 2003; 24(1):78-90. [DOI:10.1210/er.2002-0012] [PMID]
- [9] Wende AR, Huss JM, Schaeffer PJ, Giguere V, Kelly DP. PGC-1 $\alpha$  coactivates PDK4 gene expression via the orphan nuclear receptor ERR $\alpha$ : A mechanism for transcriptional control of muscle glucose metabolism. *Molecular and Cellular Biology*. 2005; 25(24):10684-94. [DOI:10.1128/MCB.25.24.10684-10694.2005] [PMID] [PMCID]
- [10] Niklas P, Li W, Jens W, Michail T, Kent S. Mitochondrial gene expression in elite cyclists: Effects of high-intensity interval exercise. *European Journal of Applied Physiology*. 2010; 110(3):597-606. [DOI:10.1007/s00421-010-1544-1] [PMID]
- [11] Lee IK. The role of pyruvate dehydrogenase kinase in diabetes and obesity. *Diabetes & Metabolism Journal*. 2014; 38(3):181-6. [DOI:10.4093/dmj.2014.38.3.181] [PMID] [PMCID]
- [12] Wang L, Mascher H, Psilander N, Blomstrand E, Sahlin K. Resistance exercise enhances the molecular signaling of mitochondrial biogenesis induced by endurance exercise in human skeletal muscle. *Journal of Applied Physiology*. 2011; 111(5):1335-44. [DOI:10.1152/japplphysiol.00086.2011] [PMID]
- [13] Movahed A. [Beneficial effects of resveratrol on reducing blood glucose and insulin resistance in T2DM (Persian)]. *Iranian South Medical Journal*. 2016; 19(1):155-66. [DOI:10.7508/ismj.1395.01.013]
- [14] Nasri S. [The effect of Resveratrol flavonoid on learning and memory in passive avoidance and Y maze in diabetic rat (Persian)]. *Iranian South Medical Journal*. 2014; 17(1):11-20. <http://ismj.bums.ac.ir/article-1-500-en.html>
- [15] Brown VA, Patel KR, Viskaduraki M, Crowell JA, Perloff M, Booth TD, et al. Repeat dose study of the cancer chemopreventive agent resveratrol in healthy volunteers: Safety, pharmacokinetics, and effect on the insulin-like growth factor axis. *Cancer Research*. 2010; 70(22):9003-11. [DOI:10.1158/0008-5472.CAN-10-2364] [PMID] [PMCID]
- [16] Shang J, Chen LL, Xiao FX, Sun H, Ding HC, Xiao H. Resveratrol improves non-alcoholic fatty liver disease by activating AMP-activated protein kinase. *Acta Pharmacologica Sinica*. 2008; 29(6):698-706. [DOI:10.1111/j.1745-7254.2008.00807.x] [PMID]
- [17] Rubiolo JA, Mithieux G, Vega FV. Resveratrol protects primary rat hepatocytes against oxidative stress damage: Activation of the Nrf2 transcription factor and augmented activities of antioxidant enzymes. *European Journal of Pharmacology*. 2008; 591(1-3):66-72. [DOI:10.1016/j.ejphar.2008.06.067] [PMID]
- [18] Mohajeri D, Monadi AR, Mousavi Gh, Rezaei Saber AP. [Cardioprotective effect of resveratrol on isoproterenol-induced experimental myocardial infarction in rat (Persian)]. *Veterinary Clinical Pathology*. 2014; 8(3):537-48. <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=253770>
- [19] Sin TK, Yung BY, Siu PM. Modulation of SIRT1-Foxo1 signaling axis by resveratrol: Implications in skeletal muscle aging and insulin resistance. *Cellular Physiology and Biochemistry*. 2015; 35(2):541-52. [DOI:10.1159/000369718] [PMID]
- [20] Linden MA, Fletcher JA, Matthew Morris E, Meers GM, Harold Laughlin M, Booth FW, et al. Treating NAFLD in OLETF rats with vigorous-intensity interval exercise training. *Medicine and Science in Sports and Exercise*. 2015; 47(3):556-67. [DOI:10.1249/MSS.0000000000000430] [PMID] [PMCID]
- [21] Mozafari M, Nekooeian AA, Panjeshahin MR, Zare HR. The effects of resveratrol in rats with simultaneous type 2 diabetes and renal hypertension: A study of antihypertensive mechanisms. *Iranian Journal of Medical Sciences*. 2015; 40(2):152-60. [PMID] [PMCID]
- [22] Delaviz H, Davoudi P, Sharif Talebian Pour M, Rad P, Sadeghi H. [The effect of resveratrol on fetal heart tissue changes after preeclampsia induced by L-name in rats (Persian)]. *Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences*. 2015; 23(7):669-78. <http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-3222-en.html>
- [23] Aminizadeh S, Habibi A, Marefat H, Shakerian S. [The role of Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4 (PDK4) on the expression of citrate synthase in the skeletal muscle After 4 weeks of endurance training in male wistar rats (Persian)]. *Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences*. 2017; 16(3):191-202. <http://journal.rums.ac.ir/article-1-3660-en.html>
- [24] Tao R, Xiong X, Harris RA, White MF, Dong XC. Genetic inactivation of pyruvate dehydrogenase kinases improves hepatic insulin resistance induced diabetes. *PloS One*. 2013; 8(8):e71997. [DOI:10.1371/journal.pone.0071997] [PMID] [PMCID]
- [25] Dlamini Z, Ntlabati P, Mbaita Z, Shoba-Zikhali L. Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4 (PDK4) could be involved in a regulatory role in apoptosis and a link between apoptosis and insulin resistance. *Experimental and Molecular Pathology*. 2015; 98(3):574-84. [DOI:10.1016/j.yexmp.2015.03.022] [PMID]
- [26] Liao ZY, Chen JL, Xiao MH, Sun Y, Zhao YX, Pu D, et al. The effect of exercise, resveratrol or their combination on Sarcopenia in aged rats via regulation of AMPK/Sirt1 pathway. *Experimental Gerontology*. 2017; 98:177-83. [DOI:10.1016/j.exger.2017.08.032] [PMID]
- [27] Egan B, Carson BP, Garcia-Roves PM, Chibalin AV, Sarsfield FM, Barron N, et al. Exercise intensity-dependent regulation of peroxisome proliferator-activated receptor  $\gamma$  coactivator-1 $\alpha$  mRNA abundance is associated with differential activation of upstream signalling kinases in human

- skeletal muscle. *The Journal of Physiology*. 2010; 588(Pt 10):1779-90. [DOI:10.1113/jphysiol.2010.188011] [PMID] [PMCID]
- [28] Nordsborg NB, Lundby C, Leick L, Pilegaard H. Relative workload determines exercise-induced increases in PGC-1 $\alpha$  mRNA. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. 2010; 42(8):1477-84. [DOI:10.1249/MSS.0b013e3181d2d21c] [PMID]
- [29] Connaughton S, Chowdhury F, Attia RR, Song S, Zhang Y, Elam MB, et al. Regulation of Pyruvate Dehydrogenase Kinase isoform 4 (PDK4) gene expression by glucocorticoids and insulin. *Molecular and Cellular Endocrinology*. 2010; 315(1-2):159-67. [DOI:10.1016/j.mce.2009.08.011] [PMID] [PMCID]
- [30] Sugden MC, Holness MJ. Interactive regulation of the pyruvate dehydrogenase complex and the carnitine palmitoyltransferase system. *The FASEB Journal*. 1994; 8(1):54-61. [DOI:10.1096/fasebj.8.1.8299890] [PMID]
- [31] Roche TE, Baker JC, Yan X, Hiromasa Y, Gong X, Peng T, et al. Distinct regulatory properties of pyruvate dehydrogenase kinase and phosphatase isoforms. *Progress in Nucleic Acid Research and Molecular Biology*. 2001; 70:33-54,IN1-IN2,55-75. [DOI:10.1016/S0079-6603(01)70013-X]
- [32] Minakawa M, Kawano A, Miura Y, Yagasaki K. Hypoglycemic effect of resveratrol in type 2 diabetic model db/db mice and its actions in cultured L6 myotubes and RIN-5F pancreatic  $\beta$ -cells. *Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition*. 2011; 48(3):237-44. [DOI:10.3164/jcbn.10-119] [PMID] [PMCID]
- [33] Goh KP, Lee HY, Lau DP, Supaat W, Chan YH, Koh AF. Effects of resveratrol in patients with type 2 diabetes mellitus on skeletal muscle SIRT1 expression and energy expenditure. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*. 2014; 24(1):2-13. [DOI:10.1123/ijsem.2013-0045] [PMID]
- [34] Barger JL, Kayo T, Vann JM, Arias EB, Wang J, Hacker TA, et al. A low dose of dietary resveratrol partially mimics caloric restriction and retards aging parameters in mice. *PloS One*. 2008; 3(6):e2264. [DOI:10.1371/journal.pone.0002264] [PMID] [PMCID]